



**Nombre del alumno: Axel Adnert Leon Lopez**

**Nombre del trabajo: resúmenes**

**Materia: Geriatria**

**Grado: 6to**

PASIÓN POR EDUCAR

**Grupo: B**

Comitán de Domínguez Chiapas a 28/05/25

# (CUERPOS DE LEWY) DEMENTIA

## DEFINICION

Trastorno del cerebro que afecta el pensamiento, movimiento y otras funciones corporales, causadas por acumulación de depósitos de prot. alfa-sinucleína

## EPIDEMIOLOGIA

- 2da demencia degenerativa
- incidencia anual de 10-15% por 1000 personas/año.
- 15-20% representa a las demencias
- Prevalencia de 5.9-9.4% en adultos

## CLINICA

- Fase prodromica:
  - Deterioro cognitivo → Fluctuación en atención y cognición.
  - Síntomas conductuales → Alucinaciones visuales
  - Fenómeno del sueño → Mov. Oculares rápidos
  - Disfunción Autonómica → Caída postural en PA
  - Síntomas físicos
- Fase demencia:
  - Dificultad en comunicación - Parkinsonismo - Riesgo Psíquico
  - Trastornos del sueño.

## DIAGNOSTICO

- → Clínica ◦ Escala.

### ALBA

◦ 17 ítems = Max 24 Pts → Mayor Puntaje → Mejor Pr.  
Tomografía, fluorodeoxiglucosa

## TRATAMIENTO

Anticolinérgico + Quetapina  
Clonazepam.

Norma

# DETERIORO C. VASCULAR

## DEFINICION

Alteracion cognitiva causada por enf. vascular, causada por problemas en el flujo sanguineo, que afecta la memoria

## EPIDEMIOLOGIA.

2da causa + frecuente de demencia.

Predomina en Oriente asiatico.

50 millones de afectados en 2018.

Prevalencia → >75 años

## CLINICA.

Se caracteriza por ser gradual

- Afeccion de funciones ejecutivas
- Desorientacion + Problemas de memoria.
- Marcha inestable
- Falta de Planificacion

## DIAGNOSTICO.

• MOCA <26 Pts

- Evaluacion Funcional

- Clinica

- Estudios de imagen → RM = microhemorragia + Atrofia cortical

## TRATAMIENTO

- Preventivo

• Dieta mediterranea

• Control de glucosa y TA.

• Evitar tabaco - Alcohol

- Sintomatico

• inhibidores de colinesterasa

• huperstigma

# FROTOTEMPORAL

## DEFINICION

Demencia progresiva que afecta a lóbulo frontal y temporal responsable de aspectos de personalidad, comportamiento y emociones

## EPIDEMIOLOGIA:

- Prevalencia 15-22 casos por cada 100,000 habitantes
- Es más frecuente en hombres y 2da causa en adultos jóvenes
- < 65 años

## CLINICA.

- Cambio en la personalidad
- Cambio en la conducta
- Apatía

## SEMANTICA.

- Comprensión de palabras alteradas
- Repetición de palabras
- Falta de nominación

## NO FUENTE AGRAMATICA.

- Habla dificultada
- Falta en comprensión de oraciones

## LOGOPENICA

- Repetición de oraciones alteradas
- Comprensión conservada

## DIAGNOSTICO.

• Escalas

- MOCA:

Aplicar en el px mayor coherencia → ≥ 26/30 Pts normal, < 25 patolo-

- ACE-R:

Poco usual y Dx deficit inicial

- GDS.

Px con EA y demencia 1-2 Pts → Normal, 3 Pts → leve, 4-7 Pts moderada - Severa

DEUROIMAGEN → RM, con glucosa marcada, C/ Protones.

## TRATAMIENTO

Sintomático: Antidepresivo → Sertralina • Antipsicóticos: Olanzapina, Quetiapina

# POB PRIONES.

## DEFINICION

La demencia por priones es un grupo de enfermedades neurodegenerativas causadas por acumulacion de proteínas anormales en el cerebro.

## EPIDEMIOLOGIA.

- Casos raros
- Mexico → Su incidencia actual no es conocido pero se calcula que existen 110 casos por año
- En LATAM los unicos lugares donde hay reporte de casos son Uruguay con 0.7 casos por millon, Argentina con 0.8 casos
- Incidencia 1-1.5 casos por millon de habitantes al año

## CLINICA

Se inicia con sintomas inespecificos

- Alteraciones del animo ----- ▶ Si progresa
- Alteracion del sueño - Deterioro cognitivo
- Irritabilidad - Deterioro de conducta
- Perdida de peso - Trastorno como Parkinsonismo monolocal o alteraciones de la marcha
- Convulsiones

## DIAGNOSTICO.

- RM
- Estudio de liquido cefalorraquideo
- Anamnesis - Clinico - FR

## TRATAMIENTO.

- Actualmente no existe tratamiento es sintomatico + control
- Control de moebnia → Clonazepam. y levetiracetam.

## II PARKINSON.

### DEFINICION

Proceso neurodegenerativo complejo de aparición en edad adulta. que se caracteriza por la pérdida pasiva de neuronas dopaminérgicas.

### EPIDEMIOLOGIA

- Prevalencia del 0.3% en general
- 0.7% en >60 años
- incidencia de 8-14 por 100 mil habitantes por año
- 1.5-2 veces más en hombres
- 2da en frecuencia más frecuente.

### CLINICA

- Temblor en reposo
- Problema de memoria
- Agnesia
- Trastorno del sueño
- Fatiga
- Conciencia
- Síntomas neuropsiquiátricos → Depresión
- Ansiedad
- Alucinación

### DIAGNOSTICA

- Escala Hoehn y Yahr.
- se caracteriza por describir la enfermedad
- clínico
- MOJ
- PET / DPELT.
- Estadio 1 → Síntomas mínimos. Afecta una parte
- Estadio 2 → Afecta ambas partes sin alteración de equilibrio.
- Estadio 3 → Discapacidad leve.
- Estadio 4 → Discapacidad severa.
- Estadio 5 → Confinado

### TRATAMIENTO

- Donepezilo → 5mg x 4 Sem
- Rivastigmina → 1.5mg x 4 Sem
- Memantina → 2 veces día