

Deterioro Cognitivo Vascular

El deterioro cognitivo vascular es un concepto amplio incluye desde el deterioro cognitivo leve hasta la demencia vascular así como patologías de carácter mixto que en algunos estudios llegan a representar hasta 15% de los casos.

Tienen un largo período presintomático en el se observan cambios moleculares, esta fase puede durar 70 y 25 años.

Los pacientes pueden volver a la normalidad.

Mecanismos

Lesiones cerebrales y parenquimatosas asociadas a deterioro cognitivo.

- Infartos múltiples. Demencia multiinfarto
- Infarto en área estratégica
- Lesiones de sustancia blanca y lagunas
 - 50% De 22 a 45 años
 - 90% > 80 años
- Hemorragia cerebral
- Hipoperfusión global
- Forma mixta → Patología mixta vascular-Alzheimer
- Degeneración Secundaria
 - Infarto
 - Isquemia subcortical
 - Pérdida de células piramidales capa 3 y 5

Factores de Riesgo

Pueden ser modificables total o parcialmente

1: Diabetes Mellitus → ↑ niveles basales de glucemia y resistencia a la insulina.

→ APP

2: Edades medias, elevación de la presión arterial incrementa el riesgo de deterioro

3: Dislipemia

4: Fibrilación auricular

5: Cardiopatía isquémica y la insuficiencia cardíaca

Diagnostico

- Criterios de VAS-COG

A / B / C / D → varia TC / RM

- Valoración Neuropsicológica → 7 ítems

- Escala de Fazekas

- Hiperintensidades en sustancias blancas → 0 / 1 / 2 / 3 / grados

- Hiperintensidades periventriculares → 0 / 1 / 2 / 3 / grados

Tratamiento

- Manejo de comorbilidades, síntomas conductuales y psicológicos

- Proporcionar apoyo familiar

- Donepezilo

- Rivastigmina

De la cultura (lingüística)

- 1. Definición de cultura
- 2. Elementos de la cultura
- 3. Funciones de la cultura
- 4. Tipos de cultura
- 5. Importancia de la cultura

Definición

- Cultura