Nombre del alumno (a): Hannia Jimenez rueda

Nombre del tema : Historias natural de la enfermedad(varicela)

Parcial : 1ero

Nombre de la Materia: fundamentos de enfermería III

Nombre del profesor E.E.Q.X: Cecilia de la cruz sanchez

Nombre de la Licenciatura : Lic. En enfermería

Cuatrimestre : 3er

Pichucalco chipas a 13 de junio 2025

Periodo de prepatogénico

AGENTE:

VIRUS varicela- zoster (VVZ).

FAMILIA:

VIRUS DE HERPES

HUESPED:

Podría afectar a toda la población principalmente a los menores de 10 años.

AMBIENTE:

En cualquier época de año más frecuentes en invierno y veranos.

PERIODO DE INCUBACION:

Suele ser de 14 a 16 días en un rango o de un rango de 10 a 21 días.

Periodo patogénico

ETAPA CLINICA

MUERTE

Neumonía encefalitis (inflamación del cerebro).

ESTADO CRONICO

- Reactivación de herpes zoster
- Neurología POSTHERPETICA
- ceguera

DEFECTO O DAÑO

Neurológicas encefalitis en niños menores de 5 años.

Cutáneas: infecciones bacterianas trombocitopenia.

SIGNOS Y SINTOMAS

24 a 72 h. posteriores al desarrollo de las lesiones cutáneas. Fiebres de 37.8 *C y 38.8 *C, hasta 39.4-ºC. las lesiones maculas eritematosas, pápulas, que evolucionan y forman vesículas claras llenas de líquidos durante tres o cuatro días, infecciones y cicatriz lesiones son pruriginosas. (que se refiere a la propiedad o característica de algo que causa o está relacionado con la picazón.

CAMBIOS TISULARES

Erupciones cutáneas con picazón que luego se convierte en vesículas, se rompen y forman costras. Estos cambios pueden afectar la piel, las mucosas, y en casos más graves, otros órganos.

PERIODO PRODROMICO

Contagio por contacto directo con lecciones cutáneas o vía de área al expulsarse por la tos, periodo de incubación de 13 a 17 días.

PREVENCION PRIMARIA

PROMOCION DE SALUD.

-Establecer campaña para la salud.

Dar platicas en las escuelas.

-Dar todo tipo de información para las campañas de vacunación.

-Remarcar que la vacuna es segura y eficaz.

-Explicar el esquema de vacunación recomendado.

-Incluyendo la dosis de refuerzo

PROTECCION ESPECIFICA.

-Evitar contacto físico con otras personas.

-Medicamentos antivirales.

-Aplicación de las vacunas.

-No compartir articulo personales como toallas, utensilios de comida o vasos para producir la propagación de los virus.

-Aplicar vacuna contra la varicela zoster.

PREVENCION SECUNDARIA

DIAGNOSTICO PRECOZ.

-Vacunación.

Administración de antihistamínicos.

-Dieta, alimentos blandos.

-Examen físico y citodiagnóstico.
Prueba de tzanck.(es una prueba que ayuda a diagnosticar una infección por herpes virus, incluyendo el virus varicela- zoster, responsables de la varicela).

TRATAMIENTO OPORTURNO.

-baño continuo pero suave con agua tibia.

-Un baño coloide puede ayudar a calmar la picazón y a refrescar la piel.

-aplicar compresas frías en las zonas en picazón puede ayudar aliviar la picazón.

PREVENCION TERCIARIA

LIMITACION DEL AÑO

-Tratamientos de las complicaciones.

-Cuarentenas.

-Prevención a través de una vigilancia adecuada al paciente.

REABILITACION

-En caso de alteraciones psicológicas, dar terapia psicosocial para habilitar al paciente a sus actividades.

-En las alteraciones de las vías respiratorias canalizar con un especialista.

Conclusión:

A continuación, le daré un pequeño resumen acerca de la varicela zoster es aún considerada benigna, presenta complicaciones a veces graves. La varicela también es una enfermedad vírica aguda muy contagiosa presente en todo el mundo. Mientras que en la infancia es casi siempre un trastorno benigno, en los puede ser mortal, especialmente en los recién nacidos y las personas inmunodeprimidas.

También hay curaciones para tratar la enfermedad de varicela por ejemplo en niños que por lo demás que estén sanos, la varicela normalmente no necesita tratamiento médico. Algunos niños pueden tomar un tipo de medicamento para aliviar la picazón. Pero en su mayor parte, la enfermedad necesita seguir su curso.

Por otra parte, la varicela les da poco en niños, a los adultos es más grave y en pacientes inmudeprimidos.

Si nunca has sufrido de varicela, debe seguir las siguientes recomendaciones: evitar el contacto directo con las lesiones de la piel de una persona enferma; y evitar estar en contacto con las secreciones respiratorias de las personas con la enfermedad.

Espero y le guste mi HISTORIA DE LA ENFERMEDAD DE LA VARICELA.

GRACIAS POR SU ATENCION.

Referencia bibliográfica:

- Instituto Nacional de Salud. Protocolo de Vigilancia en Salud Publica. Varicela codigo: 831. 2017. Disponible en: http://www.clinicamedihelp.com/documentos/protocolos/PRO%20Varicela.pdf.

- Historia natural de la varicela PDF. https://es.scribd.com/document/456498651/HISTORIA-NATURALDE-LA-VARICELA-docx.