



Ensayo

Nombre del Alumno: Jorge Iván Camas Hernández

Nombre del tema: Patología del paciente

Parcial: primero

Nombre de la Materia: Patología del adulto

Nombre del profesor: Alfonso Velásquez

Nombre de la Licenciatura: licenciatura en enfermería

Cuatrimestre: 6to cuatrimestre

insuficiencia cardíaca

Insuficiencia

La insuficiencia cardíaca puede producirse cuando el corazón no bombea (sístole) o no se llena (diástole) correctamente.

Los síntomas incluyen dificultad para respirar, fatiga, hinchazón en las piernas y ritmo cardíaco acelerado.

La insuficiencia cardíaca puede causar una acumulación de líquido que ejerce demasiada presión sobre el hígado.



Etapas

Existen cuatro estadios (A, B, C y D). Estos abarcan desde un alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca hasta una insuficiencia cardíaca avanzada.



Síntomas

Los síntomas incluyen dificultad para respirar, fatiga, hinchazón en las piernas y ritmo cardíaco acelerado.



Tratamiento

Los tratamientos incluyen comer alimentos con menos sal, limitar los fluidos y tomar medicamentos con prescripción. En algunos casos, puede ser necesario colocar un desfibrilador o un marcapasos.

Disfunción cardíaca

disfunción

La disfunción cardíaca significa que el corazón no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo. Esto puede ocurrir por diversas causas, como enfermedades de las válvulas cardíacas, arritmias o daño en el músculo cardíaco. En esencia, el corazón no puede bombear la sangre de manera eficiente, lo que puede llevar a una variedad de problemas de salud.


el corazón no puede bombear suficiente sangre rica en oxígeno para satisfacer las necesidades de su cuerpo. La insuficiencia cardíaca no significa que su corazón se haya detenido o esté a punto de dejar de latir.



Insuficiencia



Insuficiencia cardíaca:

Es el término médico para la disfunción cardíaca, y significa que el corazón no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo,



No es lo mismo que un paro cardíaco:

La insuficiencia cardíaca no significa que el corazón se haya detenido o esté a punto de hacerlo,



Transtorno del ritmo

Latidos anormales del corazón, ya sea irregulares, demasiado rápidos o demasiado lentos.

La arritmia cardíaca ocurre cuando los impulsos eléctricos del corazón no funcionan correctamente.

Es posible que no se presenten síntomas. Cuando sí los hay, pueden incluir palpitaciones, dolor en el pecho, desmayos o mareos.

Si es necesario, el tratamiento puede incluir fármacos antiarrítmicos, procedimientos médicos, dispositivos implantables y cirugía.



Síntomas

- Latidos acelerados y fuertes, o golpeteo en el pecho, denominados palpitaciones.
- Dolor en el pecho.
- Desmayos.
- Aturdimiento.
- Pulso acelerado.
- Falta de aire.

control de ritmo cardíaco

Acciones simples, pero específicas, como toser, hacer fuerza como si se estuviera defecando o ponerse una compresa de hielo en el rostro, pueden ayudar a hacer más lento el ritmo cardíaco. El equipo de atención médica puede pedirte que hagas estas acciones específicas durante un episodio de latidos rápidos

BIBLIOGRAFIA

<https://www.mayoclinic.org>

<https://cardioalianza.org>

<https://www.nhlbi.nih.gov>

<https://medineplus.gov>

<https://fundaciondelcarazon.com>

<https://www.pfizerconmigo.com.mx>

<https://www.msdmanuals.com>

<https://es.gwhospital.com>

<https://www.cigna.com>

<https://empendium.com>

