



NOMBRE DEL ALUMNO:

MARÍA CRISELDA PÉREZ MÉNDEZ

NOMBRE DEL TEMA:

UNIDAD III y VI

PARCIAL:

I PARCIAL

NOMBRE DE LA MATERIA:

PSICOPATOLOGÍA I

NOMBRE DEL PROFESOR:

LIC MONICA LISSETH QUEVEDO PEREZ

LICENCIATURA: **PSICOLOGÍA**

CUATRIMESTRES: **6TO CUATRIMESTRE**

PICHUCALCO, CHIAPAS A 12 DE JUNIO DEL 2025

Trastorno Obsesivo Compulsivo



es una afección mental que consiste en presentar pensamientos (obsesiones) y rituales (compulsiones) una y otra vez. Estos interfieren con su vida, pero no puede controlarlos ni detenerlos.

<https://www.areahumana.es/trastorno-obsesivo-compulsivo/>

Trastorno dismórfico corporal



se caracteriza por la preocupación por defectos percibidos en la apariencia física los cuales no son evidentes o son levemente visibles a otras personas. La preocupación por la apariencia debe causar malestar clínicamente significativo o deterioro del funcionamiento.

<https://www.psicologiamentesana.com/blog/trastorno-dismorfo-corporal-la-necesidad-de-modificar-la-apariencia-de-su-cuerpo-de-manera-radical/>

Trastorno de acumulación



la persona tiene de forma persistente tanta dificultad para descartar sus posesiones o separarse de ellas que los objetos se acumulan, inutilizando algunas zonas de uso diario para su cometido normal.

<https://cristinagud.com/trastorno-de-acumulacion-o-sindrome-de-diogenes/>

Tricotilomanía



Es la pérdida de cabello por las ganas de jalarlo y retorcerlo hasta que se desprende. Los pacientes son incapaces de detener este comportamiento, incluso aunque su cabello se vuelva más delgado.

<https://jaldun.com/tricotilomania-como-anomalia-capilar/>

Trastorno de excoriación



urgencia de tocar, rascar, frotar, restregar, friccionar, apretar, morder o excavar la piel de forma recurrente hasta producirse lesiones cutáneas.

<https://www.elsevier.es/>


Trastorno obsesivo compulsivo y relacionados debido a otra afección médica



es un diagnóstico de trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados en el que hay un período prominente y persistente de síntomas obsesivo-compulsivos que se cree que están relacionados con los efectos fisiológicos directos de otra afección médica.

<https://clifis.com/2023/07/31/trastorno-obsesivo-compulsivo-toc-causas-sintomas-y-tratamiento/>

Trastorno de apego reactivo



no forman el vínculo estrecho que se desarrolla normalmente entre un niño y sus cuidadores. Los niños con trastorno de apego reactivo parecen tristes, temerosos o irritables y les cuesta interactuar con los demás.

<https://www.mindya.com/es-cr/solutions/child/reactiveattachmentdisorder>


Trastorno de relación social desinhibida



es un trastorno relacionado con el trauma y el estrés que afecta a niños pequeños con antecedentes de cuidados gravemente insuficientes y se caracteriza por patrones de comportamiento aberrantes que demuestran falta de vacilación en las interacciones con adultos

<https://www.hacerfamilia.com/psicologia/trastorno-relacion-social-desinhibida-actuar-20190224161054.html>


Trastorno de estrés postraumático



es una afección de salud mental que algunas personas desarrollan tras experimentar o ver algún evento traumático. Este episodio puede poner en peligro la vida, como la guerra, un desastre natural, un accidente automovilístico o una agresión sexual.

https://unamglobal.unam.mx/global_revista/trastorno-estres-postraumatico-como-enfrentarlo/


Trastorno de estrés agudo



consiste en una reacción disfuncional, desagradable e intensa que comienza poco después de un acontecimiento traumático o abrumador y que se prolonga durante menos de un mes.

<https://centrointegraldepsicologia.com/comprendiendo-el-trastorno-de-estres-agudo/>

Trastorno de adaptación



son reacciones exageradas ante el estrés que incluyen pensamientos negativos, emociones fuertes y cambios en el comportamiento. La reacción a un cambio o acontecimiento estresante es mucho más intensa de lo que normalmente se esperaría.

<https://tratamientospsicologicos.es/trastornos-de-adaptacion/>

Trastorno de identidad disociativa



Una sensación de estar separado de ti mismo y de tus emociones. Pensar que las personas y las cosas que te rodean están distorsionadas y no son reales. Un sentido borroso de tu propia identidad.

<https://www.salud.mapfre.es/cuerpo-y-mente/psicologia/trastorno-de-identidad-disociativo-tid/>


Amnesia disociativa



involucra una incapacidad para recordar una información personal importante que en forma típica no se olvidaría. Generalmente es causada por un traumatismo o estrés.

<https://www.facebook.com/invesfo/>

Trastorno de despersonalización



Depresión o ansiedad, depresión especialmente grave, depresión que dura mucho tiempo o ansiedad con ataques de pánico. Abuso de drogas, que puede causar ataques de despersonalización o desrealización.

<https://www.psiquiatriapsicologia-dexeus.com/es/unidades.cfm/ID/>

Otros trastornos obsesivos compulsivos



El Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) puede manifestarse de diversas formas, aunque la mayoría de las veces se caracteriza por la presencia de pensamientos obsesivos y compulsiones.

<https://www.neurocavis.es/trastorno-obsesivo-compulsivo-toc>

Trastorno de ansiedad por separación.

El sufrimiento emocional intenso y repetido al pensar en la separación o cuando se está lejos del hogar o de los seres queridos.

<https://www.centropicosanitariogaliani.com/2022/11/08/ansiedad-por-separacion/>

Mutismo selectivo

Su causa o causas se desconocen. La mayoría de los expertos cree que los niños con esta afección heredan una tendencia a ser ansiosos e inhibidos. La mayoría de los niños con esta afección tienen cierta forma de miedo (fobia) extrema.

<https://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/psicologia-infantil/que-es-el-mutismo-selectivo-y-como-afecta-a-los-ninos>

Fobia específica y Trastorno de ansiedad social

temor intenso y persistente a ser observado y juzgado por los demás. Este miedo puede afectar el trabajo, la escuela y otras actividades diarias. Incluso puede dificultarle hacer nuevos amigos y conservarlos.

https://www.clinicasaurea.com/blog/54_diferencia-ansiedad-social-y-fobia-social.html

Trastorno de pánico y Agorafobia

Sentir temor de quedarse solo. Sentir miedo a estar en lugares donde el escape podría ser difícil. Sentir miedo a perder el control en un lugar público.

<https://itaepsicologia.com/que-es-el-trastorno-de-panico-con-agorafobia/>

Trastorno de ansiedad generalizada.

Es un trastorno mental en el cual una persona a menudo está preocupada o ansiosa respecto a muchas cosas y le parece difícil controlar esta ansiedad.

<https://luismiguelreal.blog/2024/03/01>

Trastorno de ansiedad inducido por sustancias y medicamentos y Trastorno de ansiedad debido a afección médica

se refiere a una situación en la que los síntomas de ansiedad, como preocupación excesiva o miedo, son directamente causados por una condición médica subyacente.

<https://adicionesasturias.com/trastornos-inducidos-por-sustancias/>

Trastorno de síntomas somáticos

se presenta cuando una persona siente una ansiedad extrema exagerada a causa de síntomas físicos. La persona tiene pensamientos, sensaciones y comportamientos tan intensos relacionados con los síntomas que siente que no puede hacer algunas de las actividades de su vida diaria.

<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000955.htm>

Trastorno de ansiedad por enfermedad

El trastorno de ansiedad por enfermedad, a veces denominado hipocondriasis o ansiedad por la salud, implica preocuparse excesivamente por tener o poder contraer una enfermedad grave. Es posible que no tengas síntomas físicos.

<https://www.nytimes.com/es/2018/06/26/espanol/hipocondria-ansiedad-tratamiento.html>

Trastorno de conversión

El trastorno de síntomas neurológicos funcionales, antes conocido como trastorno de conversión, consiste en síntomas o déficits neurológicos que se desarrollan en forma inconsciente e involuntaria y, en general, afectan una función motora o sensitiva.

<https://www.msmanuals.com/es/>

Factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas

Los factores psicológicos que influyen sobre otras afecciones médicas se diagnostica cuando los factores psicológicos o conductuales afectan negativamente el curso o el pronóstico de una afección médica existente.

<https://encolombia.com/medicina/revistas-medicas/academica/va-13/factores-psicologicos-enfermedad/>

Trastorno facticio

se da cuando alguien dice, sin que sea la verdad, que la otra persona tiene síntomas físicos o mentales de una enfermedad, o la hierde o hace que se enferme para engañar a los demás

<https://www.esmental.com/que-es-el-trastorno-facticio/>

Bibliografía

- Real Academia Española. «psicopatología». Diccionario de la lengua española (23.ª edición).
- Jaspers K (1911). Psicopatologia General. Beta, Buenos Aires.
- Blankenburg, Wolfgang (1983). «Psicopatologia como ciencia básica de la psiquiatría». Rev chil neuropsiq 21(3):177-188.
- Tellenbach (1975). Melancholie. Problemgeschichte. Endogenität. Typologie (en alemán). Springer Verlag.
- Ey (Henry). Estudios Psiquiátricos. Polemos y Gador.
- Fuchs, Thomas (2011). «The Brain. A mediating organ». Journal of consciousness studies 18: 196-211.
- Berrios G (2008). «Psicopatología descriptiva». Historia de los síntomas de los trastornos mentales. Psicopatología descriptiva desde el siglo XIX. Fondo de Cultura Económica.
- Hyman, SE (2010). «The diagnosis of mental disorders: the problem of reification». Ann Rev Clin Psychol.
- Schneider (1992). Klinische Psychopathologie (en alemán). Georg Thieme Verlag.