



UDS

Mi Universidad

SUPER NOTA

NOMBRE DEL ALUMNO: PEREYRA CALVO CAROL DENISSE

TEMA: UNIDAD IV: ALTERACIONES OFTALMOLÓGICAS.

PARCIAL: SEGUNDO.

MATERIA: MEDICO QUIRURGICA II.


NOMBRE DEL PROFESOR: LIC. ELIZABETH ESPINOZA LOPEZ

LICENCIATURA: ENFERMERÍA.

CUATRIMESTRE: SEXTO.

Frontera Comalapa, Chiapas a 14 de junio del 2025.

AMBLIOPÍA



La reducción uni o bilateral de la AV a pesar de una corrección óptica apropiada.

Ocasionalmente puede alternar de un ojo a otro durante el transcurso del tratamiento

Clasificación


- Ambliopía estrábica

Pérdida unilateral de la visión



- Ambliopía por anisometropía (refracción desigual)

Ocurre en pacientes con miopía unilateral intensa o con astigmatismo grave, como resultado de recibir constantemente imagen borrosa de un objeto.




- Ambliopía por privación de estímulo

Ocurre en un lactante que nace con una opacidad macular congénita



ESTRABISMO




La pérdida de paralelismo de los ejes visuales con alteración de la visión binocular.

Plantea diferentes problemas

La pérdida de la función binocular.



La reducción de la visión del ojo desviado (ambliopía u ojo vago).



Y el aspecto estético desfavorable.



Alteraciones Oftalmológicas

LACERACIONES CONJUNTIVALES




Las heridas que afectan a la conjuntiva ocular producen dolor, ojo rojo y sensación de cuerpo extraño tras un traumatismo ocular.

Las laceraciones conjuntivales deben ser exploradas extensamente para descartar la presencia




Las trataremos con pomada antibiótica de aureomicina (tetraciclina) cada 8 horas durante 4-7 días. asociada de una ruptura escleral y un cuerpo extraño intraocular.



Alteraciones Oftalmológicas



BLEFARITIS



La inflamación/infección de los bordes palpebrales.

- Blefaritis seborreica



Las laceraciones conjuntivales deben ser exploradas extensamente para descartar la presencia asociada de una ruptura escleral y un cuerpo extraño intraocular.



- Blefaritis estafilocócica:



Se sospecha que el origen es estafilocócico cuando las escamas son amarillentas y dejan lesiones ulcerativas al ser retiradas.



ORZUELO



Una infección aguda de las glándulas sebáceas palpebrales.



Se sospecha que el origen es estafilocócico cuando las escamas son amarillentas y dejan lesiones ulcerativas al ser retiradas.

DACRIOADENITIS



Es

Una infección de la glándula lagrimal principal. Se asocia a parotiditis, mononucleosis u otras enfermedades víricas.



Clinicamente presentan una tumoración inflamatoria unilateral y dolorosa en el tercio externo del párpado superior (signo de la S)




Signo de la "S tumbada"



Y edema de la zona súpero temporal del mismo que provoca una pseudoptosis. Pueden acompañarse de adenopatía preauricular y fiebre.



CATARATAS CONGÉNITAS



Definición

Se denomina catarata cualquier opacidad en el cristalino, que puede originar un descenso de la AV.

Si un niño con una catarata congénita completa, se opera a los 7 años de edad, no hay recuperación alguna, permaneciendo definitivamente ciego.



Alteraciones Oftalmológicas

RETINOBLASTOMA



Definición

El 6% es hereditario

La edad de presentación es alrededor de los 18 meses, siendo raro su descubrimiento más allá de los 7 años.

En la oftalmoscopia se observa una masa blanquecina que, según su forma de crecimiento, puede acompañarse de desprendimiento de retina (crecimiento exofítico) o endoftalmitis (crecimiento endofítico).

