

Mi Universidad

NOMBRE DEL ALUMNO: Juan Carlos Garcia Garcia

TEMA: Súper Nota

PARCIAL: Primer Parcial.

MATERIA: Enfermería Medico Quirúrgica II

NOMBRE DEL PROFESOR: Lic. Elizabeth Espinoza López

LICENCIATURA: Enfermería.

CUATRIMESTRE: sexto Cuatrimestre

ALTERACIONES OFTALMOLÓGICAS

AMBLIOPÍA

LA AMBLIOPÍA ES LA REDUCCIÓN UNI O BILATERAL DE LA AV A PESAR DE UNA CORRECCIÓN ÓPTICA APROPIADA. AUNQUE EN ALGUNAS OCASIONES PUEDE PRODUCIRSE EN AMBOS OJOS, GENERALMENTE SÓLO SE PRESENTA EN UNO.



ESTRABISMO


EL ESTRABISMO ES LA PÉRDIDA DE PARALELISMO DE LOS EJES VISUALES CON ALTERACIÓN DE LA VISIÓN BINOCULAR. EL ESTRABISMO PLANTEA DIFERENTES PROBLEMAS: LA PÉRDIDA DE LA FUNCIÓN BINOCULAR, LA REDUCCIÓN DE LA VISIÓN DEL OJO DESVIADO



LACERACIONES CONJUNTIVALES

LAS HERIDAS QUE AFECTAN A LA CONJUNTIVA OCULAR PRODUCEN DOLOR, OJO ROJO Y SENSACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO TRAS UN TRAUMATISMO OCULAR.

LAS LACERACIONES CONJUNTIVALES DEBEN SER EXPLORADAS EXTENSAMENTE PARA DESCARTAR LA PRESENCIA ASOCIADA DE UNA RUPTURA ESCLERAL Y UN CUERPO EXTRAÑO INTRAOCULAR



BLEFARITIS

BLEFARITIS SEBORREICA: EXISTE CLÍNICAMENTE UN ENROJECIMIENTO DEL BORDE DE LOS PÁRPADOS, QUE PRESENTAN UNA DESCAMACIÓN DE LAS PESTAÑAS CAUSADA POR UN EXCESO DE LA SECRECIÓN GRASA DE LAS GLÁNDULAS SEBÁCEAS.



ORZUELO

INFECCIÓN AGUDA DE LAS GLÁNDULAS SEBÁCEAS PALPEBRALES. SE PRESENTA COMO UN NÓDULO DOLOROSO CON PUNTO DE PUS AMARILLENTO CENTRADO POR UNA PESTAÑA. SU TRATAMIENTO INCLUYE CALOR LOCAL (3 VECES AL DÍA DURANTE 5 MINUTOS) Y ANTIBIÓTICO TÓPICO (ERITROMICINA POMADA 3 VECES AL DÍA, 1 SEMANA).



DACRIOADENITIS

INFECCIÓN DE LA GLÁNDULA LAGRIMAL PRINCIPAL. SE ASOCIA A PAROTIDITIS, MONONUCLEOSIS U OTRAS ENFERMEDADES VÍRICAS. CLÍNICAMENTE PRESENTAN UNA TUMORACIÓN INFLAMATORIA UNILATERAL Y DOLOROSA EN EL TERCIO EXTERNO DEL PÁRPADO SUPERIOR Y EDEMA DE LA ZONA SÚPEROTEMPORAL DEL MISMO QUE PROVOCA UNA SEUDOPTOSIS.

CATARATAS CONGÉNITAS

SE DENOMINA CATARATA CUALQUIER OPACIDAD EN EL CRISTALINO, QUE PUEDE ORIGINAR UN DESCENSO DE LA AV. EL CRISTALINO NORMALMENTE ES TRANSPARENTE Y ENFOCA LA LUZ EN LA RETINA PARA PERMITIR LA VISIÓN. SI ESTÁ OPACO, PUEDE CAUSAR VISIÓN BORROSA O INCLUSO PÉRDIDA DE VISIÓN.



RETINOBLASTOMA

CÁNCER OCULAR QUE SE DESARROLLA EN LA RETINA, LA CAPA SENSIBLE A LA LUZ EN LA PARTE POSTERIOR DEL OJO, Y ES MÁS COMÚN EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, AUNQUE PUEDE AFECTAR A ADULTOS EN CASOS RAROS. PUEDE AFECTAR UNO O AMBOS OJOS Y, SI NO SE TRATA, PUEDE LLEVAR A LA PÉRDIDA DE VISIÓN E INCLUSO SER MORTAL.