NOMBRE DE LA ALUMNA: YARENI GRICEL SANCHEZ MORALES

NOMBRE DE LA PROFESORA: LIC. REBECA MARILI VAZQUEZ ESCOBAR

MATERIA: ENFERMERIA DEL ADULTO

LICENCIATURA: ENFERMERIA

CUATRIMESTRE: 6 CUATRIMESTRE

CUIDADOS DE ENFERMERIA AL PACINTE ONCOLOGICOS

Cáncer Es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar cualquier órgano del cuerpo. Dichas enfermedades se caracterizan por una profunda alteración de la regulación del crecimiento y/o muerte celular y por la adquisición de una capacidad para invadir localmente y diseminarse a distancia.

Control del cáncer: Conjunto de estrategias para reducir la carga de la enfermedad en la sociedad, incluyendo promoción, prevención, detección temprana, tratamiento y cuidados paliativos.

Tipos de tratamientos:

Locales: Cirugía y radioterapia.

Sistémicos: Quimioterapia, hormonoterapia y terapias dirigidas.

Efectos secundarios de la quimioterapia:

Toxicidades comunes: Náuseas, vómitos, fatiga, pérdida de cabello, etc.

Toxicidades específicas:

Dependiendo del agente quimioterápico utilizado.

Intervenciones de enfermería:

Realice una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, características, aparición / duración, frecuencia, calidad, intensidad o severidad del dolor y factores desencadenantes. Administración de analgésicos, Compruebe el historial de alergias a medicamentos, Controle los signos vitales antes y después de la administración de los analgésicos, Potenciación de la seguridad, Manejo de líquidos / electrolitos, Monitorización nutricional, Apoyo emocional.

Agentes quimioterápicos: Máscara facial (Ojos apagados, expresión abatida, movimientos fijos o escasos, etc.). Fatiga, Agitación, Respuestas mediadas por el sistema nervioso simpático (Temperatura, cambios en la posición corporal), Disminución de la presión arterial, Disminución de la presión y del volumen del pulso Disminución del turgor de la piel y lengua, Disminución de la diuresis, Disminución del llenado venoso., Sequedad de las membranas mucosas, Sequedad de la piel, Alteración del hematocrito, Aumento de la temperatura corporal, Aumento de la frecuencia del pulso, Aumento de la concentración de la orina, Peso corporal inferior en un 20% a su peso ideal. Palidez de las membranas mucosas. Bajo tono muscular, Halitosis. Flatulencias. Vómitos, Masa abdominal palpable.

INTOXICACIONES Y ENVENENAMIENTO

Entendemos como sustancia tóxica o veneno a cualquier sustancia que al introducirse en nuestro organismo produce efectos nocivos sobre nuestra salud produciéndose una intoxicación.

VIAS DE PENETRACION

La intoxicación se producirá, sin tener en cuenta las vías de penetración, cuando la sustancia tóxica llegue al torrente circulatorio y se distribuya por todo el cuerpo. **Las vías de penetración más comunes para que se produzca una intoxicación laboral son:**

VÍA ORAL, VÍA RESPIRATORIA, CONTACTO CUTANEO.

EFECTOS TOXICOS

Efectos locales: sólo se producen en la parte del cuerpo que ha sido expuesta, generalmente son la piel, la vía respiratoria, los ojos y la vía digestiva. Piel. Que en el primer contacto se produzca enrojecimiento, escozor, o incluso quemadura. Que las primeras veces no se produzca ningún efecto pero con el contacto prolongado se produzca los primeros efectos. Y cuando una sustancia química cáustica entra en contacto con la piel producirá quemaduras. Vía respiratoria.

Intoxicación por Gases Monóxido de carbono: Inodoro y muy peligroso, Síntomas: mareos, vómitos, confusión, disnea, Actuación: sacar al aire libre, RCP si es necesario, oxígeno. Grupos de Pacientes con Intoxicaciones: A. Preescolares (<5 años), No voluntarias, En casa. Tóxico conocido, Pronóstico favorable, Casi siempre asintomáticos.

Principales Agentes Tóxicos en Niños

A. Fármacos (50%)

Antitérmicos: paracetamol (más común).

Psicofármacos: benzodiacepinas.

Anticatarrales/antitusivos: combinados, peligrosos en <4 años. Productos del Hogar (2º grupo). Lejía, detergentes, cosméticos, hidrocarburos.

Tratamiento: Carbón activado: impide la absorción del tóxico en el tracto digestivo. Considerado el "antídoto universal" en Urgencias Pediátricas.