

**Nombre del alumno;**

**Alan yahir Ochoa perez**

**Nombre del tema:**

**Sífilis**

**Parcial:**

**1ero**

**Nombre de la materia:**

**Enfermería del adulto**

**Nombre del profesor:**

**Leydi diana estrada García**

**Nombre de la licenciatura:**

**Enfermería**

**Cuatrimestre:**

**6to**

# Sífilis

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) causada por una bacteria llamada *Treponema pallidum*. Se contagia por contacto directo con una llaga de sífilis durante las relaciones sexuales sin protección o por un beso. También puede transmitirse de la madre al feto durante el embarazo. La sífilis afecta el área genital, los labios, la boca o el ano y puede causar complicaciones graves si no se trata.

## SIFILIS

- ❖ Tres estadios clínicos : Primaria, secundaria y terciaria
- ❖ Dos periodos epidemiológicos asintomáticos (sífilis latente temprana y tardía).
- ❖ Las lesiones cutáneas de la sífilis secundaria varían ampliamente y pueden imitar cualquier dermatosis inflamatoria.
- ❖ El aumento en un 75% en la incidencia de la sífilis primaria y secundaria observada desde 1990 subraya la importancia de reconocer formas clínicas inusuales como la que se presenta.



Dave S, Gopinath D, Thappa D. Nodular secondary syphilis. *Dermatology Online Journal* 2003;9(1):9.

## vías de transmisión

Las principales formas de contagio de la sífilis son:

Contacto íntimo sin preservativo, especialmente si se tienen varias parejas sexuales.

Contacto directo con sangre de personas infectadas por el *Treponema pallidum*, como puede ocurrir en una transfusión de sangre, por ejemplo.

Compartir agujas y jeringas contaminadas, en el caso del uso de drogas inyectadas, por ejemplo.

La sífilis se transmite durante el sexo oral, vaginal y anal.

Durante el embarazo y por transfusiones sanguíneas.

En mujeres embarazadas puede provocar la muerte del feto o del recién nacido o transmitirse al neonato (sífilis congénita).

El uso correcto y sistemático de preservativos durante las relaciones sexuales puede prevenir la enfermedad.



## Tratamiento

El tratamiento para la sífilis se realiza con el uso de antibióticos como la penicilina G benzatina (Benzetacil), ceftriaxona o doxiciclina, con el objetivo de eliminar la bacteria *Treponema pallidum*.

La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) que se transmite a través del contacto sexual con una persona infectada, pero también puede ser transmitida de la madre al bebé durante el embarazo, afectando su desarrollo.

El tratamiento de la sífilis debe ser indicado por un infectólogo, ginecólogo, urólogo o médico general, dependiendo de la fase de la infección. En casos de neurosífilis, es necesario el ingreso hospitalario, ya que se trata de una enfermedad más avanzada.

ETAPA DE INFECCIÓN	TRATAMIENTO
Primaria Secundaria Latente temprana (Menor de un año)	Penicilina benzatinica G, 2,4 millones de unidades IM en dosis única
Latente tardía (Mayor de un año) Duración desconocida	Penicilina benzatinica G, 2,4 millones de unidades IM semanal por tres semanas.
Neurosífilis	Penicilina G cristalina 2-4 millones unidades IV cada cuatro horas por 10 a 14 días.

## **Medidas de prevención**

hacerse pruebas regularmente y mantener una comunicación abierta con las parejas sexuales. Para prevenir la sífilis, es fundamental practicar sexo seguro, usar preservativos,

### **Estrategias de Prevención**

**Uso de Preservativos:** Utiliza preservativos de látex o poliuretano en todas las relaciones sexuales vaginales, anales y orales. Esto reduce significativamente el riesgo de transmisión de la sífilis y otras infecciones de transmisión sexual (ITS)

**Pruebas Regulares:** Es fundamental hacerse pruebas periódicamente para detectar la sífilis, especialmente si tienes múltiples parejas sexuales o si eres sexualmente activo. La detección temprana es clave para un tratamiento efectivo y para prevenir la transmisión a otros

**Monogamia y Comunicación:** Mantener una relación monógama y abierta sobre la salud sexual con tu pareja. Hablar sobre historial de ITS y hacerse pruebas juntos puede ayudar a tomar decisiones más informadas y protegerse mutuamente

**Evitar el Consumo de Drogas y Alcohol:** La abstinencia de drogas y alcohol puede ayudar a prevenir conductas sexuales de riesgo y reducir la probabilidad de exposición a la sífilis

**Evitar el Contacto con Lesiones:** La sífilis puede transmitirse a través del contacto directo con las llagas o lesiones. Si tienes llagas o síntomas, es vital evitar cualquier forma de actividad sexual y buscar atención médica