



CUADRO SINOPTICO UNIDAD IV, METODOS DE DIAGNOSTICO




Carlos Rodriguez Dania Sofia

Universidad del Sureste

Lic. Medicina Veterinaria y Zootecnia


MVZ. Barrera Roberto Garcia Sedano

Tapachula, Chiapas a 6 de Julio del 2025





TIPOS DE VOMITOS



VOMITO BILIOSO:

Se caracteriza por ser de color amarillo o verdoso, a menudo espumoso, y se produce cuando el estómago está vacío, expulsando bilis.

VOMITO ESPUMOSO Y BLANCO:

Se caracteriza por ser de color amarillo o verdoso, a menudo espumoso, y se produce cuando el estómago está vacío, expulsando bilis.

VOMITOS FETIDO

Se caracteriza por ser de color amarillo o verdoso, a menudo espumoso, y se produce cuando el estómago está vacío, expulsando bilis.

VOMITO ALIMENTARIO:

Se caracteriza por ser de color amarillo o verdoso, a menudo espumoso, y se produce cuando el estómago está vacío, expulsando bilis.

BIBLIOGRAFIA:

- TORTORA, G. & DERRICKSON, B. (2018). PRINCIPIOS DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA. EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA.

- MSD MANUAL PROFESIONAL. (2024).

[HTTPS://WWW.MSDMANUALS.COM](https://www.msddmanuals.com)

- MAYO CLINIC. (2024).

[HTTPS://WWW.MAYOCLINIC.ORG/ES](https://www.mayoclinic.org/es)