



Reyna González David Antonio

Zootecnia de Bovinos

Mapa Conceptual “Distocias en Bovinos”

M.V.Z. García Sedano Barreda Roberto

“6°. A”

Sábado 05 de julio del 2025

# DISTOCIAS EN BOVINOS

## PRESENTACION NORMAL

El feto está en posición anterior (cabeza y extremidades delanteras primero), con el dorso hacia arriba. Esta es la presentación ideal para un parto sin complicaciones. No causa distocia, pero se usa como referencia para detectar anomalías.



## FLEXIÓN DE LA ARTICULACIÓN DEL HOMBRO


Una o ambas extremidades anteriores están flexionadas a nivel del hombro, impidiendo la salida del feto.

El ternero no puede salir, se requiere corrección manual dentro del útero o cesárea si no se logra.



## DORSO PUBICA

El dorso del feto está hacia abajo, alineado con el pubis de la madre. Aunque la cabeza y miembros pueden estar correctamente dirigidos, el dorso invertido dificulta el paso por el canal del parto. Dificultad en la expulsión, requiere reposicionamiento o intervención veterinaria.



## FLEXIÓN LATERAL DE LA CABEZA


La cabeza del feto está desviada hacia un lado o hacia atrás, no alineada con el canal del parto.

Impide el paso normal. Puede causar lesiones a la madre si se intenta sacar sin corregir la posición.



## CAUDAL

El feto se presenta con las extremidades traseras primero. Puede ser normal si el dorso está hacia arriba y las patas extendidas. Si la cabeza no acompaña (como en partos anteriores), hay riesgo de asfixia porque el cordón umbilical se comprime antes de que el ternero respire.



## FLEXIÓN LATERAL DE LA CABEZA

En presentación posterior, las extremidades traseras están dobladas por los corvejones (tarsos), lo que bloquea la salida.

Se debe realizar una extensión cuidadosa de las patas para permitir el parto.



## **BIBLIOGRAFIAS:**

<https://www.bortagaray.com.uy/distocia>