



Mapa conceptual

LUISANA ARÉVALO CRUZ

Sedano García

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Medicina veterinaria y zootecnia

Zootecnia de Bovinos

Tapachula, chiapas

Sábado 5 de julio

DISTOCIA BOVINA

Problemas durante el parto que requieren asistencia para la expulsión del ternero.

CAUSAS MATERNAS DE DISTOCIA

Inercia uterina

El útero no se contrae adecuadamente para expulsar al ternero, ya sea desde el inicio

Desproporción fetopélvica

El ternero es demasiado grande para el canal de parto de la vaca.

Dilatación incompleta del cuello uterino

El cuello del útero no se abre lo suficiente para permitir el paso del ternero.

Torsión uterino

El útero gira sobre sí mismo, bloqueando el canal de parto.

Pelvis anormal

Problemas en la estructura ósea de la pelvis de la vaca que dificultan el paso del ternero.

CAUSAS FETALES DE DISTOCIA

Presentación, posición y postura anormales

El ternero puede estar en una posición incorrecta, como de nalgas, de costado, o con las patas o la cabeza mal colocadas.

Tamaño excesivo del feto

Un ternero muy grande en relación con la pelvis de la madre.

Feto con malformaciones

Anomalías congénitas que dificultan el parto.

Gemelos

Dos terneros en el útero pueden causar problemas de espacio y presentación.

SIGNOS DE DISTOCIA

-Fases de parto prolongadas.

La dilatación del cuello uterino o la fase de expulsión se extienden más de lo esperado.

-Bolsas fetales rotas sin expulsión.

Las membranas fetales se rompen, pero el ternero no sale.

Descarga vaginal anormal

Presencia de sangre, pus o fluidos anormales.

Falta de progreso

A pesar de los esfuerzos de la vaca, no se observan avances en la expulsión del ternero.

TRATAMIENTO

Oxitocina

Se utiliza para estimular las contracciones uterinas.

Antibióticos

Pueden ser necesarios para prevenir infecciones secundarias.

PREVENCIÓN

Manejo adecuado de la nutrición, la selección de reproductores y el monitoreo de las vacas durante la gestación y el parto

<https://www.clubganadero.com/partos-distocicos-en-bovinos/>