



SUPER NOTA DEL MANEJO DEL LECHON DESPUES DEL NACIMIENTO HASTA EL DESTETE

RAMOS OLVERA MONSERRAT

MVZ. García Sedano Barreda Roberto

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia

Zootecnia en Porcinos

Tapachula, Chiapas

05 de julio del 2025

MANEJO del lechon

Nacimiento

- Preparación del parturitorio: antes del parto asegurarse que esté en un ambiente limpio, seco y cómodo.
- Asistencia en el parto: detectar complicaciones y asistir si el parto se complica.
- Limpieza y secado: limpiar al lechón con una toalla para eliminar mucosidad y facilitar la respiración.


1)



primeros minutos a horas

- Corte de cordón umbilical: si no es de manera natural, cortar el cordón a unos 2-3cm del abdomen desinfectar con yodo.
- Inmunoglobulinas y calor: iniciar ingesta de calostro, preferentemente dentro de las primeras 2 hrs y proporcionar una fuente de calor.
- Secado y protección: secar los lechones y colocarlos en un área seca y cálida para prevenir hipotermia.

2)



Cuidados en las primeras hrs y días.

- Alimentación: asegurarse que cada lechón tenga acceso al calostro en la primera hora de vida, es vital para la inmunidad pasiva.
- Control de temp: mantener una temp ambiente entre 30-32°C durante los primeros días.
- Identificación: marcar a los lechones mediante tizas o anillos para facilitar su seguimiento.

3)



manejo en semanas tempranas

- Control sanitario: monitorear signos de enfermedades como diarrea, neumonía o infecciones umbilicales.
- Higiene: mantener limpia la zona de paridera, retirar heces y restos de leche para prevenir infecciones.
- Suplementación: en algunos casos se puede administrar sueros o vitaminas si hay signos de debilidad.

4)



Hacia el destete

- Reducción del consumo de leche: comenzar a ofrecer alimentos sólidos a partir de las 2 a 3 semanas, para preparar los lechones en la transición.
- Enfriamiento gradual: disminuir gradualmente la dependencia del calostro y leche, dando la ingesta de alimentos sólidos.
- control de peso y salud: vigilar el peso, la apetencia y el estado sanitario de los lechones, interviniendo en caso de problemas.

5)



Destete (al rededor de las 4-8 semanas)

- Transición: la meta es que los lechones consigan una ingesta suficiente de alimentos sólidos antes del destete completo.
- Instalación en el área de reposo: tras el destete, trasladarlos a un área limpia, con buena ventilación y alimentación adecuada para facilitar su crecimiento y adaptación.

6)



Un manejo cuidadoso desde el nacimiento hasta el destete impacta profundamente en la salud, el crecimiento y la productividad de los lechones.

BIBLIOGRAFIA

- <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=51f36bb11394914fd368e74a4119fcf11fbc5fcc450100b3f2d38c3cfec3b0f6JmItdHM9MTc1MTE1NTlwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=12e98631-288c-6a28-14fc-95a229846beb&psq=manejo+del+lechon+desde+el+nacimiento+hasta+el+destete&u=a1aHR0cHM6Ly9wZWw1YXJpb3MuY29tL2JpYmxpb3RIY2EtZGlnaXRhbC1pc3NuL3B1YmxpY2FiaW9uL3ZvbC0yL251bS0xMi9tYW5lam8tZGUtY2VyZGFzLXktbGVjaG9uZXMtZW4tbGEtZXRhcGEtZGUtbGFjdGFuY2lhlzp-OnRleHQ9TG9zJTlw2JqZXRpdm9zJTlwc29uJTlwcHJvZHVjaXIIMjBlbCUyMG0lQzMIQTF4aW1vJTlwbiVDMyVCQW1lcm8lMjBkZSxjcmVjaW1pZW50byUyMGFkZWw1YWRvJTlwZGVzZGUIMjBlbCUyMG5hY2ltaWVudG8lMjBoYXN0YSUyMGVsJTlwZGVzdGV0ZS4&ntb=1>
- <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=971d30cc59feba396973e14d98bd83411213d04cada55a74bbe67a26f218cd6fJmItdHM9MTc1MTE1NTlwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=12e98631-288c-6a28-14fc-95a229846beb&psq=manejo+del+lechon+desde+el+nacimiento+hasta+el+destete&u=a1aHR0cHM6Ly9ibG9nLmFncm92ZXRtYXJrZXQuY29tL2d1aWEtbWFuZWpvLWxIY2hvbi1kZXN0ZXRIw&ntb=1>