



**Angeles Jaqueline Gonzalez Matias**

**LIC. Angel de Jesus Vaquez Citalan**

**Infografia del aparato digestivo en  
geriatricos  
y sistema genitourinario**

**Licenciatura en enfermeria**

**6 Cuatrimestre**

**14/06/2025**

# PATOLOGIA DEL APARATO DIGESTIVO EN GERIÁTRICOS




## QUE ES

En los ancianos, las patologías del aparato digestivo son frecuentes y pueden incluir diverticulosis, diverticulitis, estreñimiento, ERGE, intolerancia a la lactosa, síndrome del intestino irritable (SII) y malabsorción.

## DIVERTICULOSIS Y DIVERTICULITIS

**Diverticulosis y diverticulitis:**  
La formación de divertículos en el colon es más común en personas mayores, y puede provocar inflamación (diverticulitis) con dolor abdominal, fiebre y otros síntomas.



## ESTREÑIMIENTO

La disminución de la movilidad intestinal, el uso de ciertos medicamentos y cambios en la dieta pueden contribuir al estreñimiento, un problema común en la tercera edad.




## ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO (ERGE):

El debilitamiento del esfínter esofágico inferior puede permitir que el ácido estomacal regrese al esófago, causando síntomas como ardor y dolor.



## DISFAGIA:

La dificultad para tragar, especialmente sólidos, puede ser causada por alteraciones mecánicas o neurológicas en el esófago y puede aumentar el riesgo de desnutrición.



### BIBLIOGRAFIA

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/dysphagia/symptoms-causes/syc-20372028>


# SISTEMA GENITOURINARIO

## EN GERIÁTRICOS




### QUE ES

En los geriátricos, el sistema genitourinario experimenta cambios relacionados con la edad que pueden afectar la salud urinaria y reproductiva. Estos cambios pueden variar entre hombres y mujeres y pueden aumentar el riesgo de infecciones, incontinencia y otros problemas.




### HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA (HPB):

La próstata puede crecer, causando dificultad para orinar, goteo, necesidad de ir al baño con más frecuencia y dificultad para vaciar completamente la vejiga.



### DISMINUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TESTOSTERONA:

Aunque no tan drástica como en las mujeres, la disminución de testosterona puede afectar la función sexual y el tono muscular.



### DISMINUCIÓN DE ESTROGENOS

La disminución de estrógenos después de la menopausia puede causar cambios en la vagina y el útero, como atrofia, sequedad y menor elasticidad, lo que puede causar dolor durante las relaciones sexuales y mayor riesgo de infecciones.



### DEBILIDAD DEL SUELO PÉLVICO

Los músculos que sostienen la vejiga y el útero pueden debilitarse, lo que puede causar incontinencia y prolapso de órganos pélvicos.



### RETENCIÓN URINARIA

La incapacidad para vaciar completamente la vejiga puede ocurrir debido a una variedad de factores, como la HPB, problemas neurológicos o medicamentos.



### INCONTINENCIA URINARIA

La pérdida involuntaria de orina puede ser común y se puede clasificar en diferentes tipos, como la de esfuerzo, la de urgencia y la mixta.

#### BIBLIOGRAFÍA

<https://www.msmanuals.com/es/hogar/trastornos-renales-y-del-tracto-urinario/biolog%C3%ADa-de-los-ri%C3%B1ones-y-de-las-v%C3%ADas-uritarias/efectos-del-envejecimiento-en-las-v%C3%ADas-uritarias?ruleredirectid=757>