



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

MATERIA
enfermería médico quirúrgico

TEMA
patologías del sistema digestivo

ALUMNA
Paulina Inés Santizo Gomes


DOCENTE
Ariadne Danahe Vicente Albores

FECHA
14/06/2025

PATOLOGÍAS DEL SISTEMA DIGESTIVO



apendicitis aguda



es la inflamación aguda del apéndice vermiforme, que suele provocar dolor abdominal, anorexia y dolor a la palpación abdominal

causado por: obstrucción del apéndice, a menudo por heces endurecidas, un cuerpo extraño o tejido inflamado

síntomas: fiebre, náuseas, vómito, pérdida del apetito, hinchazón abdominal
suele medir más de 6 mm de diámetro, aunque puede variar, y puede alcanzar hasta 30 cm de longitud

diagnóstico:

:(historial clínico), el examen físico y, en algunos casos, estudios de imagen



perforación gastrointestinal

es una condición grave donde hay un orificio en la pared del estómago, permitiendo que el contenido estomacal se filtre a la cavidad abdominal.

causado por: lesiones o traumas, enfermedades inflamatorias, obstrucciones intestinales, y ciertas enfermedades como la enfermedad de Crohn, la diverticulitis y la úlcera péptica.

síntomas: dolor abdominal severo y sensibilidad, fiebre, náuseas, vómitos y, en algunos casos, escalofríos

Diagnóstico: presentación clínica, estudios de imagen y, en algunos casos, endoscopia o laparoscopia, TC abdominal



hemorragia gastrointestinal

se define como la pérdida de sangre que se origina en el tracto digestivo, que va desde el esófago hasta el ano. Es una condición que puede ser grave

síntomas: vómitos con sangre o sangre oscura (borra de café) hasta heces negras y alquitranadas (melena), heces con sangre roja brillante, o dolor abdominal

causas: hemorroides, úlceras pépticas, desgarres o inflamación en el esófago, diverticulosis y diverticulitis, colitis ulcerativa o ulcerosa y enfermedad de Crohn, pólipos del colon o cáncer de colon, estómago o esófago



obstrucción intestinal



es una condición seria en la que el intestino delgado o grueso se bloquea, impidiendo el paso de alimentos y heces. Este bloqueo puede ser parcial o completo

síntomas: dolor abdominal de tipo cólico, hinchazón, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, incapacidad para expulsar gases o heces, y a veces diarrea si la obstrucción es parcial

causado por: infección, retención fecal, ciertos medicamentos, enfermedad inflamatoria, adherencia

TX: reposición de líquidos, electrolitos, sonda nasogastrica, medicamentos, cirugía





isquemia intestinal

se refiere a una serie de afecciones que ocurren cuando el flujo de sangre que llega a los intestinos disminuye o se detiene

causado por: coágulos sanguíneos, estrechamiento de las arterias por acumulación de placa, o baja presión arterial, medicamentos

- **sintomas:** Dolor intenso y repentino en el abdomen.
- Necesidad urgente de defecar.
- Defecación vigorosa con frecuencia.
- Sensibilidad o distensión del abdomen, también llamada simplemente distensión.
- Heces con sangre.
- Náuseas y vómitos

Tratamientos:

staurar el flujo sanguíneo al intestino y puede incluir medidas iniciales como reposo digestivo e hidratación, así como el uso de antibióticos y medicamentos para prevenir o disolver coágulos



bibliografía

<https://www.msdmanuals.com/es/hogar/trastornos-gastrointestinales/urgencias-gastrointestinales/introducci%C3%B3n-a-las-urgencias-gastrointestinales>