



SUPER NOTA

***“PATOLOGÍAS DEL SISTEMA DIGESTIVO QUE
REQUIERAN DE CIRUGÍA DE EMERGENCIA”***

DE LOS SANTOS SOLORIO HANNA MICHELL

VICENTE ALBORES ARIADNE DANAHE

ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

TAPACHULA CHIAPAS

14 DE JUNIO DE 2025

PATOLOGIAS DEL SISTEMA DIGESTIVO QUE REQUIEREN CIRUGIA DE EMERGENCIA




1

APENDICITIS AGUDA > APENDICECTOMIA

Apendicitis aguda es la inflamación repentina y grave del apéndice, la cual puede ser causada por la obstrucción del apéndice con heces, un cuerpo extraño, un tumor o una infección.

Es la inflamación del apéndice. Suele requerir cirugía de emergencia debido al riesgo de que el apéndice se perfora, lo que provoca una infección grave (peritonitis) y pone en peligro la vida del paciente.

La cirugía de emergencia permite extirpar el apéndice inflamado y evitar complicaciones potencialmente mortales.




PERFORACION GASTROINTESTINAL

2

Es la formación de un orificio en la pared de algún órgano del sistema digestivo, como el esófago, estómago, intestino delgado o grueso.

Suele requerir cx de emergencia debido a la alta probabilidad de complicaciones potencialmente mortales, como peritonitis, sepsis y muerte. La liberación de contenido intestinal a la cavidad abdominal puede causar una infección grave y rápida que requiere intervención quirúrgica inmediata para reparar la perforación y evitar la propagación de la infección.



3

HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL

Es el sangrado que se produce en el tracto gastrointestinal, que va desde la boca hasta el recto. Puede manifestarse como sangrado visible en el vómito, en las heces o como sangrado oculto que no es visible.

La cx es necesaria cuando los métodos menos invasivos, como la endoscopia, no pueden detener o localizar la causa del sangrado, o cuando el sangrado es grave y puede conducir a complicaciones como choque o anemia severa.



OBSTRUCCION INTESTINAL

4

Es una condición en la que el paso de alimentos, líquidos y heces a través del intestino delgado o grueso está bloqueado o dificultado. Este bloqueo puede ser parcial o completo y puede causar síntomas como dolor abdominal, hinchazón, vómitos y estreñimiento.




Suele requerir una cx de emergencia debido a la alta probabilidad de complicaciones graves, como la pérdida de riego sanguíneo (isquemia) y la muerte tisular (gangrena) del intestino, lo que puede conducir a perforación y peritonitis, causando sepsis y, potencialmente, la muerte si no se trata a tiempo.


5

ISQUEMIA INTESTINAL

Es una condición en la que el flujo sanguíneo hacia el intestino se reduce o se detiene. Esto puede causar daño a los tejidos intestinales y, si no se trata, puede llevar a complicaciones graves, como la muerte del tejido intestinal.



Suele requerir cx de emergencia debido al riesgo de daño irreversible al tejido intestinal y la posibilidad de complicaciones graves como septicemia y muerte. Si el flujo sanguíneo al intestino se interrumpe repentinamente, la falta de oxígeno puede provocar que partes del intestino mueran (infarto intestinal).



BIBLIOGRAFÍA

- <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002921.htm>
- <https://www.health.com/perforated-bowel-8750599#:~:text=La%20cirug%C3%ADa%20inmediata%20para%20reparar,como%20sepsis%20e%20insuficiencia%20org%C3%A1nica.>
- <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/gastrointestinal-bleeding/diagnosis-treatment/drc-20372732#:~:text=Estudios%20por%20im%C3%A1genes.&text=Si%20tu%20sangrado%20gastrointestinal%20es,poco%20frecuente%20que%20esto%20ocurra.>
- https://www.msmanuals.com/es/hogar/trastornos-gastrointestinales/urgencias-gastrointestinales/obstrucci%C3%B3n-intestinal#Causas_v758153_es
- <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/intestinal-ischemia/diagnosis-treatment/drc-20373950#:~:text=Es%20posible%20que%20la%20cirug%C3%ADa,ó%20dilatarse%20los%20vasos%20sangu%C3%ADneos.>