




## ¿QUE ES EL SHOCK?

El **shock** es una **afección potencialmente mortal** que ocurre cuando el cuerpo no recibe un flujo sanguíneo suficiente, lo que provoca que las células y órganos no obtengan el oxígeno y nutrientes necesarios para funcionar adecuadamente.

### ¿QUE ES HIPOPERFUSION?

- La hipoperfusión es un estado médico que se refiere a la insuficiente circulación de sangre hacia los tejidos del cuerpo, lo que puede causar daño celular y comprometer la función de órganos vitales.



### COMO IDENTIFICAR EL SHOCK


- El principal signo que llama la atención en un shock es que la **presión arterial es muy baja**, acompañada de un pulso muy rápido pero débil. El afectado siente ansiedad y agitación, y temblores. Presencia de cianosis, es decir, mucosas (labios y encías) y uñas azuladas.

### SIGNOS DE HIPOPERFUSION

- Confusión mental y pérdida transitoria de conciencia.**
- Tachicardia y hipotensión.**
- Piel fría y húmeda.**
- Alteraciones motoras o sensitivas focales.**
- Bajo gasto de orina y estado mental alterado**



# Tipos de SHOCK




### 1. SHOCK HIPOVOLÉMICO

- Causa:** Pérdida significativa de volumen sanguíneo o líquidos (hemorragias, deshidratación, quemaduras).
- Mecanismo:** Disminución del volumen circulante → Menor retorno venoso → Disminución del gasto cardíaco.
- Síntomas:** Hipotensión, taquicardia, piel pálida y fría, disminución del gasto urinario.

### 2. SHOCK CARDIOGÉNICO

- Causa:** Fallo en la función del corazón como bomba (infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca severa, arritmias graves).
- Mecanismo:** El corazón no puede bombear eficazmente → Disminución del gasto cardíaco → Hipoperfusión.
- Síntomas:** Hipotensión, dificultad para respirar, edema pulmonar, distensión venosa yugular.





### 3. SHOCK DISTRIBUTIVO

- Se caracteriza por una distribución anormal de la sangre, con vasodilatación excesiva y disminución de la resistencia vascular periférica. Se divide en:
  - Shock Séptico:** Infección sistémica grave → Respuesta inflamatoria masiva → Vasodilatación.
  - Shock Anafiláctico:** Reacción alérgica severa → Liberación de histamina → Vasodilatación y permeabilidad capilar aumentada.
  - Shock Neurogénico:** Lesión del sistema nervioso central → Pérdida del tono simpático → Vasodilatación.



### 4. SHOCK OBSTRUCTIVO

- Causa:** Obstrucción en el flujo sanguíneo (taconamiento cardíaco, embolia pulmonar, neumotórax a tensión).
- Mecanismo:** Bloqueo mecánico impide el llenado o vaciado efectivo del corazón.
- Síntomas:** Hipotensión, dificultad respiratoria, distensión venosa yugular, ausencia de ruidos pulmonares (en neumotórax)



**Licenciatura en Enfermería**

**Asignatura:**



**PRACTICAS PROFECIONALES**

**Docente:**

**ARIDNE DANAHE VICENTE ALBORES**



**Actividad:**

**Super nota Tipos de shock**

**Alumno:**

**Abigail Yamileth Ortiz Cabrera**

**9**

**Cuatrimestre**

