Nombre de alumno: Rocio Paola Molina Mendoza

Nombre del profesor: Sandra Edith Moreno López

Nombre del trabajo: Calendario de vacunación y desparasitación en aves

Materia: Zootecnia de aves

Grado: 6°

Parcial: 4

Grupo: “A” Medicina Veterinaria Y Zootecnia

Ocosingo Chiapas, 2 de agosto del 2025

Calendario de vacunación y desparasitación para aves de postura

	Descripción	vía de aplicación	Edad de vacunación	Consideraciones
HVT, Sv1 / marek	Se utiliza para prevenir contra la enfermedad de marek que afecta al sistema nervioso	Subcutánea	1 día de edad	Ayuda a prevenir la parálisis viral
Newcastle (Rl New Live) / lasota	Ayuda a prevenir la enfermedad viral de newcastle	Ocular o agua de bebida	11 días de edad	Ayuda al sistema respiratorio
Triple avíar / newcastle, cólera, coriza	Ayudara a prevenir tres enfermedades estimulando el sistema inmunológico	Subcutáneamente en el cuello	11 días de edad	Genera anticuerpos que protegen de estas tres enfermedades
Viruela (Rl pox live)	Son virus vivos atenuados efectivos para proteger a las aves	Pliegue del ala	16 días de edad	La vacunación se da por la punción en la membrana del ala, importante en zonas tropicales
Re aplicación newcastle + BI	Reaplicación	agua de bebida	18 a 20 semanas	Refuerzo del sistema respiratorio
Mycoplasma (Mg- bac)	Esta vacuna contiene el microorganismo inactivado o atenuado que inducirá a una respuesta inmune	subcutáneo en el cuello	Antes de 5 semanas de edad	Ayudara a reducir la severidad y duración de la infección por micoplasma
Coccidia (coxi vax)	Ayuda a prevenir esta enfermedad parasitaria que causa diarrea y pérdida de peso	2 gotas en el pico	15 días de edad	Ayudan a reducir la virulencia a una respuesta inmunitaria
Desparasitante	Desparasitasión interna	oral	Semana 12	Repetir cada 8 a 10 semanas
Desparasitante	Desparasitación interna y externa (ivermectina, piretrinas)	Oral y spray	Cada 2 meses	Control integral para la producción de campo

Presented with xmind

Calendario de vacunación y desparasitación para aves de engorda

	Descripción	vía de aplicación	Edad de vacunación	Consideraciones
Marek	Se utiliza para prevenir contra la enfermedad de marek que afecta al sistema nervioso	Subcutánea	1 día de edad	Ayuda a prevenir la parálisis viral
Newcastle (cepa B1 o hitchner B19 + bronquitis infecciosa (B1)	Ayuda a prevenir la enfermedad viral altamente contagiosa	Ocular o agua de bebida	5 a 7 días	Inicia la inmunización contra enfermedades respiratorias
Re aplicación newcastle + B1	Ayudara a prevenir y a estimular su sistema inmunológico y protegerlas contra el virus	agua de bebida o spray	18 a 21 días de edad	Refuerzo esencial antes de la etapa final de engorda
Desparasitante interno (albendazol o levamisol)	Desparasitasión interna	oral (agua o alimento)	25- 28 Días	Control de nematodos intestinales
Toltrazuril	Desparasitación interna (coccidia)	Oral	Cada 3 o 4 meses	reduce la densidad de la población tiene un enfoque multifacético

Bibliografía:

- NewCastle B1 . (sin fecha). Share.google. Recuperado el 3 de agosto de 2025 de https://share.google/uaJz7hp8aLTBpTy39
- NOBILIS® RISMAVAC. (2020, January 30). MSD Salud Animal México. https://share.google/p3X0fO5oi2pyOpFOV
- Detalle. (n.d.). Share.Google. Retrieved August 3, 2025, from https://share.google/7m8nLLMUEhAyHVz3v
- Viruela Aviar. (n.d.). Difesa. Retrieved August 3, 2025, from https://share.google/ZXqIuvhWYmTMGtWZa

Presented with **xmind**