UDS

Nombre de alumno(a): Deysi Nayeli Jimenez Lorenzo

Nombre del profesor: MVZ. Sandra Edith Moreno López

Nombre del trabajo: calendario de vacunación y desparasitación

Materia: zootecnia de Aves

Grado: 6°

Grupo: Medicina Veterinaria y Zootecnia

Ocosingo, 02 de agosto de 2025.

CALENDARIO DE VACUNACIÓN EN AVES DE ENGORDA Y PONEDORAS.

Vacunas.	Días de aplicación.	Vías de administración.	Descripción.	Consideraciones a tomar.
Marek	1er día de nacido.	Subcutánea o in-ovo.	La vacuna contra la enfermedad de Marek es un virus vivo utilizado para proteger a las aves contra esta enfermedad dado que afecta en el sistema nervioso y a los órganos linfoides de las aves.	-Huevos con embriones. -Técnica de vacunación. -Edad y salud.
Newcastle.	10º día de vida.	Ocular, nasal y oral.	La vacuna contra la Newcastle se utiliza una variedad de cepas de virus atenuado o inactivo para generar inmunidad en las aves, ya que tiende a tener problemas nerviosos, parálisis en las alas, patas y cuello.	-Técnica de vacunación. -Pollitos sanos.
Viruela aviar.	3º y 6º semana de vida.	Punción en el ala.	La vacuna contra la viruela aviar es de importancia en las aves ya que puede trasmitirse a otros animales incluso a los humanos algunos síntomas son muerte repentina, cresta y barbilla se vuelve morados, ronchas, fiebre etc.	-Técnica de vacunación. -Edad y salud del ave.
Triple aviar (Newcastle, Pasteurella multocida y haemophilus paragallinarum)	31 días de vida.	Intramuscular o subcutánea.	La vacuna de triple aviar cuenta con tres enfermedades el refuerzo de la Newcastle, la pasteurella multocida es una enfermedad que causa depresión, letargo, falta de apetito, diarrea, descarga nasal o ocular, cresta y barbilla cianóticas. La haemophilus paragallinarum o conocida como coriza infecciosa se caracteriza por secreción nasal, estornudo, conjuntivitis, edema facial, disminución de la producción de huevo.	-Técnica de vacunación. -Aves sanas.
Trai Covac. (Newcastle,Pasteurella multocida tipo 1,2 y 3, y E.coli)	31 días de vida o 15 días después de aplicar la triple aviar.	Intramuscular o subcutánea.	En cuento a la vacuna Trai covac es casi similar a la triple aviar a diferencia que esta vacuna contiene la colibacilosis dado que el ave presenta tos, estornudos, abatimiento, inapetencia, plumas erizadas, diarrea, inflamación en la piel, y la muerte.	-Técnica de vacunación. -Aves sanas.

Las vacunas se pueden administrar tanto a aves de postura como a las de engorda la diferencia aquí es que a las aves de engorda suelen administrar de 3 a 4 vacunas dado que su crecimiento es rápido y económicamente no resulta las 5 vacunas.

CALENDARIO DE DESPARASITACIÓN EN AVES DE ENGORDA Y POSTURA.

Edad a desparasitar.	Productos para desparasitar aves de engorda y postura.	Descripción y consideración.
8º semanas de vida	-Toltrazuril. -Ivermectina. -Fevendazol. -Albendazol. -Abamectina. -Praziquantel. -Flubendazol.	Para tener un buen desarrollo de nuestras aves es necesario desparasitarlos dado que el tener parásitos conlleva a una perdida de ganancia de, pero y monetario es crucial para evitar perdida. Los criterios a considerar para desparasitar deben ser el enfoque que tengamos con ellos, que se encuentren bien de salud.
13º semanas de vida	-Toltrazuril. -Ivermectina. -Fevendazol. -Albendazol. -Abamectina. -Praziquantel. -Flubendazol.	
Cada 6 meses.	-Toltrazuril. -Albendazol. -Flubendazol.	En esta etapa de desparasitación son mas para las aves de postura dado que las de engorda no llegan a los 6 meses de vida, por ello el uso de un desparasitante que no afecte al consumo humano es crucial por ello algunos fármacos se puede usar sin afectar al huevo.

-BIBLIOGRAFIA.

Enfermedad de Marek en aves de producción - Avicultura - Manual de veterinaria de MSD

TRAI-COVAC frasco de 50 ml - SUVET

FLUBENDAZOL para uso veterinario en PERROS, GATOS, PORCINOS y AVES, contra gusanos nematodos

Plan de Vacunación para Aves: Guía Completa 2025 | Sanidad Avícola

5 Pastillas Desparasitantes de Gallinas (Efectivas y rápidas)

Vacunación in ovo, fundamentos y principios en avicultura