Nombre de alumno: Adrián Vega Sánchez

Nombre del profesor: Sandra Edith López Moreno

Nombre del trabajo: Calendario de Vacunación

Materia: Zootecnia de Aves

Grupo: Medicina en Veterinaria y Zootecnia

Ocosingo, 2 de agosto de 2025

Newcastle

Fecha de vacunación: 1er día de vida y refuerzo en 14-21 días, 5 semanas y 10 semanas

La enfermedad de Newcastle es una de las que suelen abatir con mayor intensidad a las regiones templadas o húmedas, agregando que la gran mayoría de situaciones suelen llegar a ser 100% letales.

Medio: Agua bebida, Ocular y Nasal

Marek

Fecha de vacunación 1er día de vida y refuerzo en 14-21 días, 5 semanas y 10 semanas

Trastorno linfoproliferativo que afecta principalmente a los pollos. Es causado por un herpesvirus del serotipo 1. Suele confundirse con otras enfermedades y fácilmente puede pasar desapercibido hasta encontrarlo muerto. Se recomienda refuerzo debido a que puede ser de alta incidencia

Medio: Subcutáneo

Viruela Aviar

Fecha de vacunación: 16 días

Consta de una enfermedad viral la cual es de la familia Poxviridae. Este se encuentra en dos formas, Seca y húmeda. La incidencia de esta enfermedad en la región suele llegar fuerte debido a que suele desarrollarse en medios cálidos y húmedos características que se encuentran constantemente aquí

Medio: Membrana del ala

Triple Aviar

Fecha de vacunación:7 semanas de edad

Esta contiene inmunización de tres enfermedades; Newcastle, Cólera y Coriza, aunque existen formulaciones que contienen colibacilosis de igual forma. Al igual que las anteriores descripciones, estás enfermedades suelen surgir en temporada de lluvia o siendo más específicos en medios húmedos. Por lo que el uso de estas vacunas es de gran necesidad.

Medio: Ocular, agua bebida y subcutáneo

Coriza

Fecha de vacunación: 9 semanas de edad

En aves de postura, la coriza aviar suele ser una de las enfermedades con mayor afectación produciendo pérdidas de hasta el 40 por ciento. Agregando que las sobrevivientes a dicha exposición quedan como portadoras pasivas de la enfermedad

Medio: Subcutáneo

Calendario de desparasitación

	Enero	Feb	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic
Int	●			●			●			●		
Ext	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Febendazol ● Polvos de Piretro ● Fipronil

● Ivermectina ● Cipermetrina ● Eprinectin

*Nota: El uso de diferentes fármacos tiene como objetivo la disminución de resistencias a los propios. El uso de desparasitantes externos deprenda de factores como el manejo de la infraestructura al igual que la higiene que se tiene en general en el lugar