AVES DE ENGORDA CALENDARIO DE VACUNACION

Día de Vida	Vacunación	Enfermedades que previene	Consideraciones de aplicación
1-3	Enfermedad de Marek (HVT)	Enfermedad de Marek	Se aplica en la incubadora o al recibir los pollitos. Es una vacuna viva que se administra por vía subcutánea o intramuscular. Mantén la cadena de frío y no agites el vial bruscamente.
7-10	Enfermedad de Gumboro (cepa intermedia)	Enfermedad de Gumboro	Se administra por vía oral en el agua de bebida. Priva a las aves del agua por 1-2 horas antes para asegurar que la beban por completo. Diluye la vacuna en la cantidad de agua que consumirán en 2 horas.
12-14	Enfermedad de Newcastle (cepa B1)	Enfermedad de Newcastle	Puede aplicarse en el agua de bebida o por spray. Si usas agua, sigue las mismas consideraciones que para la vacuna de Gumboro.
18-21	Enfermedad de Gumboro (cepa intermedia plus)	Enfermedad de Gumboro	Refuerzo de la dosis anterior. Se administra en el agua de bebida.
25-28	Enfermedad de Newcastle (cepa LaSota)	Enfermedad de Newcastle	Refuerzo. Se administra en el agua de bebida o por spray. Se recomienda usar una cepa diferente para una mejor respuesta inmune.
<p style="text-align: center;">Aves de Engorde (Pollos de Engorde)</p> <p>Debido a su ciclo de vida corto, la desparasitación no es un procedimiento rutinario, a menos que se detecte una infestación. En caso de ser necesaria, se realiza una sola vez durante el ciclo de crecimiento, generalmente entre los 14 y 21 días de vida. El antiparasitario se administra en el agua de bebida o en el alimento.</p>			

AVES CALENDARIO DE VACUNACION AVES DE POSTURA

EDAD	VACUNACION	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	CONSIDERACIONES DE APLICACIÓN
1 día	Enfermedad de Marek (HVT)	Enfermedad de Marek	Vía subcutánea en la incubadora.
7-10 días	Enfermedad de Gumboro	Enfermedad de Gumboro	Vía oral en el agua de bebida.
12-14 días	Enfermedad de Newcastle (cepa B1)	Enfermedad de Newcastle	Vía oral en el agua de bebida o spray.
4 semanas	Bronquitis Infecciosa (BI)	Bronquitis Infecciosa	Vía oral en el agua de bebida.
6 semanas	Enfermedad de Gumboro (cepa intermedia plus)	Enfermedad de Gumboro	Refuerzo por vía oral en el agua de bebida.
8 semanas	Enfermedad de Newcastle (cepa LaSota)	Enfermedad de Newcastle	Refuerzo por vía oral en el agua de bebida o por spray.
10 semanas	Viruela Aviar (cepa de Pato)	Viruela Aviar	Vía de punción en el ala. Utiliza un aplicador especial y verifica la reacción de la vacuna 7-10 días después.
12 semanas	Encefalomiелitis Aviar (AE)	Encefalomiелitis Aviar	Vía oral en el agua de bebida.
14 semanas	Coriza Infecciosa (inactivada)	Coriza Infecciosa	Vía intramuscular o subcutánea. Es una vacuna inactivada que requiere aguja y jeringa estéril.
16 semanas	Newcastle y Bronquitis Infecciosa (inactivada)	Newcastle y BI	Vacuna de refuerzo antes del inicio de la postura. Se aplica por vía intramuscular o subcutánea.

Aves de Postura (Gallinas Ponedoras)

En las aves ponedoras, que tienen un ciclo de vida más largo, la desparasitación es un proceso regular para mantener su salud y productividad.

Primera desparasitación: Se recomienda realizarla antes de que las gallinas empiecen a poner huevos, alrededor de las 18-20 semanas de vida.

Desparasitaciones de mantenimiento: Después de la primera dosis, se debe desparasitar a las gallinas cada 2 a 3 meses. Es importante llevar un registro para no olvidar las fechas.

Desparasitación externa: El control de ácaros y piojos debe ser constante, especialmente en los meses más cálidos. Puedes utilizar polvos o sprays periódicamente y mantener una buena higiene en el gallinero.

Periodo de retiro: Siempre ten en cuenta el periodo de retiro del producto, es el tiempo que debe pasar entre la última administración del medicamento y el consumo de los huevos o la carne del ave. Esto es crucial para la seguridad alimentaria.