Nombre de la alumna: Elva Berenice Gómez Méndez

Materia: Zootecnia de aves

Nombre del docente: M.V.Z. Sandra Edith Moreno López

Nombre del trabajo: Calendario de vacunación y desparasitación

Unidad: 4

Grupo: Lic. Medicina Veterinaria y Zootecnia

CALENDARIO DE VACUNACIÓN Y DESPARACITACIÓN EN AVES.

Edad de vacunación (semanas).	**Vacunas.**		**Método de vacunación.**
1er día de edad	Marek	HVT, Ss1	SC en el cuello
11 días de edad	Newcastle (RL New Live)	Lasota	Ocular o agua de bebida
11 días de edad	Triple Aviar	Newcastle, Cólera, Coriza	SC en el cuello
15 días de edad	Coccidia (Coxi Vax	Vacuna contra la coccidiosis aviar	2 gotas en el pico
16 días de edad	Viruela (RL Pox Live)	Modificada de paloma	Pliegue del ala
Antes de 5 semanas de edad	Mycoplasma (MG-BAC)	Bacterina de Mycoplasma gallisepticum	SC en el cuello
5 semanas de edad	Coriza (RL coriza)	Cepas W, Spross y Modesto	SC en el cuello
7 semanas de edad	Newcastle (RL New Live Triple Aviar)	Lasota Newcastle Cólera, Coriza	Ocular o agua de bebida. SC en el cuello
9 semanas de edad	Coriza (RL Coriza)	Cepas W, Spross y Modesto	SC en el cuello
10 semanas de edad	Viruela (RL Pox Live)	Modificada de paloma	Pliegue del ala
22 semanas de edad 7 meses de edad. Cada 3 meses.	Triple aviar. Newcastle, coriza, cólera (Pasteurella)	Bacterina inactivada en Hidróxido de Aluminio	SC en el ala. SC en el cuello. SC en el cuello.

Edad/ Momento	Tipo de desparasitación	Producto común	Observaciones
2 semanas de vida	Interna	Piperazina, Febendazol, Albendazol.	Contra lombrices (Nemátodos).
4 semanas	Interna y externa	Ivermectina, Oral o tópica.	Repetir si hay infestación de ácaros y piojos.
Cada 2 a 3 meses	Interna	Albendazol, Levamisol.	Rotar principios activos.
Cada 3 a 4 meses	Externa	Permetrina, Ivermectina tópica.	Aplicar en el cuello o bajo alas.
Antes de la postura (ponedoras)	Interna	Mebendazol, Levamisol.	Importante para evitar huevos contaminados.
Previo a reproducción	Interna y externa	Revisión total y tratamiento.	Asegura transmisión libre de parásitos.
Después de tratamientos antibióticos	Interna	Suave (como piperazina).	Para reestablecer el equilibrio intestinal.