



Mi Universidad

Calendario

Nombre del Alumno: Daniela Lopez Alvaro

Nombre del tema: Calendario de vacunacion y desparasitacion

Parcial: Cuarto

Nombre de la Materia: Zootecnia en porcinos

Nombre del profesor: Sandra Edith Moreno Lopez

Nombre de la Licenciatura: Medicina veterinaria y zootecnia

Cuatrimestre: Sexto

Calendario de vacunación y desparasitación en cerdos

Grupo / Edad	Vacunas recomendadas	Dosis / esquema básico	Observaciones / refuerzo
Lechones – 3–4 sem	PCV2 (circovirus porcino tipo 2) PRRS Aujeszky (Herpesvirus porcino 1)	1 dosis IM (2 mL) a las 3–4 sem 1 dosis IM o SC a las 3 sem 1 dosis IM a las ~4 sem	Refuerzo opcional a las 6–8 sem según riesgo Refuerzo en madres, 4–6 meses o antes del servicio Refuerzo a los 10 días; luego cerdas/verracos c/4–6 meses
Lechones 10–20 días	Streptococcus suis E. coli enterotoxigénica (K88/K99) Lawsonia intracellulularis (ileitis)	1ª a los 10–12 días + revac 3–5 sem Dosis catalogada (vacuna viva, IM/SC) Vacuna viva/inyectable a 5–6 sem o 6–10 sem	Busca reducir poliserositis y MKY mortalidad Lechones 10–14 sem o madre preparto Puede aplicarse vía oral/inyección
Reproductoras – multíparas	“Parvo-Lepto” + Erisipela Aujeszky Influenza porcina (H1N1 etc.)	1 dosis a los 15–30 días antes del parto 1 dosis 2–4 sem antes de la monta Tras años libres, ocasional en cebo y madres	Revacunar c/gestación o cada 6 meses Revacunar periódicamente c/4–6 meses Si hay riesgo, usualmente 2–3 sem antes del parto
Verracos / Sementales	“Parvo-Lepto”, Erisipela Aujeszky Influenza porcina	2 dosis iniciales + revac cada 6 meses 1–2 dosis según edad, revac c/4–6 meses Si se aplica en granja	Frecuentemente a la llegada o pre-servicio Reduce excreción del virus en semen o ambiente Refuerzo cada ciclo de producción si es necesario

Categoría	Momento	Sustancia	Notas
Cerdas multíparas	Cada 6-8 meses	Ivermectina	Refuerzo según análisis coproparasitológico
Lechones (destete/ciclo crecimiento)	Destete (día 0), luego a los 30–45 días, repetición cada 3 meses	Febendazol, levamisol o ivermectina según resultado coproparasitológico	Debe rotarse principio activo y no mezclar con vacunas.
Verracos	Cada 6 meses	Ivermectina	Intervalo estricto en unidades tecnificadas