



Edad del Cerdo	Vacuna	Enfermedad que previene	Consideraciones de Aplicación
3 semanas	Mycoplasma hyopneumoniae	Neumonía Enzoótica	Se aplica por vía intramuscular. Es la primera dosis, fundamental para la prevención de problemas respiratorios en la etapa de engorda.
3 semanas	Peste Porcina Clásica (PPC)	Peste Porcina Clásica	Se aplica por vía intramuscular. En zonas endémicas como Chiapas, la vacunación es obligatoria y debe seguir un calendario estricto.
5 semanas	Mycoplasma hyopneumoniae	Neumonía Enzoótica	Es la segunda dosis (refuerzo) para asegurar una inmunidad duradera. Vía intramuscular.
10-12 semanas	Mal Rojo (Erisipela Porcina)	Mal Rojo	Se aplica por vía intramuscular. En granjas con historial de la enfermedad, puede aplicarse antes, a partir de las 8 semanas.

## DESPARACITACION

### Lechones y Engorda:

21-25 días de vida: Desparasitación interna con ivermectina, fenbendazol o levamisol. Ayuda a controlar la carga de lombrices intestinales.

2-3 semanas después: Se recomienda una segunda dosis para cortar el ciclo de vida del parásito.

### Cerdas Reproductoras:

Al momento del destete: Desparasitación interna y externa. Es un buen momento para tratar a la cerda sin riesgo para los lechones.

3-4 veces al año: Un programa de desparasitación regular es clave para mantener la productividad del hato.

Edad/Etapa	Vacuna	Enfermedad que previene	Consideraciones de Aplicación
Al destete	Parvovirus Porcino y Mal Rojo	Fallos reproductivos y Mal Rojo	Se aplica por vía intramuscular. Es crucial para la salud reproductiva de la cerda.
3 semanas antes del parto	E. coli, Clostridium perfringens	Diarrea neonatal	Se aplica por vía intramuscular a las cerdas gestantes para transferir anticuerpos a los lechones a través del calostro.
3-4 semanas antes del parto	Peste Porcina Clásica (PPC)	Peste Porcina Clásica	Refuerzo anual para mantener altos niveles de anticuerpos que protejan a los lechones.