



Nombre de la alumna: Elva Berenice Gómez Méndez

Materia: Zootecnia de porcinos

Nombre del docente: M.V.Z. Sandra Edith Moreno López

Nombre del trabajo: Vacunación y desparasitación

Unidad: 4

Grupo: Lic. Medicina Veterinaria y Zootecnia

<b>Vacuna</b>	<b>Antígeno</b>	<b>Edad</b>	<b>Vía de administración</b>
Parvovirus	Virus	Hembras 8 a 2 semanas anterior a las monta. Machos 1 sola vacuna a los 6 a 8 meses de edad.	IM
Rinitis atrófica	Bordetella bronchiséptica, Pasteurella multócida toxigénica.	Cerda gestante 2 veces, la primera entre 5 y 4 meses antes del parto y la segunda entre las 3 y 2 semanas.	IM
Salmonellosis	.....	3 semanas de edad y a las 16 semanas.	Oral o SC
PRRS	Virus del Síndrome Respiratorio Reproductivo y Porcino	Vacunar a toda parvada 2 veces con un intervalo de 30 días. Vacunar hembras de reemplazo y machos al entrar y 30 días después. Vacunar a los lechones a los 21 días de edad.	IM o Intradérmica
Esreptococos suis	.....	Lechones de 10 a 12 días de edad y una revacunación entre 3 a 5 semanas de edad. Vacunación anual en hembras de cría antes del parto.	IM
Escherichia coli	.....	Cerdo entre las 10 y 14 semanas de edad, a las cerdas entre las 2 y 4 semanas antes del parto, y a los	IM

		sementales cada 6 meses.	
Auyesky	Herpesvirus	Cerdos entre los 10 y 14 semanas de edad, las cerdas entre 2 y 4 semanas antes del parto, sementales cada 6 meses.	IM
Enfermedad del ojo azul	Paramixovirus	Cerdas entra las 2 y 4 semanas antes del parto.	IM
Erisipela	Bacteria Erysipelothrix rhusiopathiae	Lechones 15 días después del destete y repetir 2 a 3 semanas después. Primerizas 2 semanas antes del parto. Hembra adulta: 2 semanas antes del servicio. Machos cada 6 meses.	IM
Fiebre porcina clásica	Flaviviridae	Cerdos una vez entre las 7 y 9 semanas de edad. Hembras de reemplazo y cerdas adultas 1 mes antes de la monta. Semental cada 6 meses.	IM
H. Parasuis	Haemophilus parasuis	2 a 3 semanas de edad.	IM
Ileitis	Bacteria Lawsonia intracellularis	5 a 6 semanas de edad. Hembras de reemplazo 6 meses de edad.	IM
Influenza porcina	Orthomyxoviridae	Hembras gestantes 2 a 3 semanas antes	IM

		del parto, la primera vacunación a las 8 semanas de edad seguida por vacunación de refuerzo con un intervalo de 3 semanas entre cada una.	
Leptospirosis	Leptospira interrogans, Leptospira borgpetersenii	Hembras primerizas 2 veces, entre las 4 a 2 semanas antes de la monta. Hembras adultas al destete. Sementales cada 6 meses.	IM
Micoplasmosis	.....	Hembras de reemplazo y las cerdas adultas entre 5 a 3 semanas del parto.	IM

### Lechones (0-8 semanas).

Edad	Tratamiento	Tipo de desparasitante	Desparasitante sugerido
7 a 10 días	Control de coccidiosis (si hay antecedentes)	Coccidios	<b>Toltrazuril</b> (oral)
3 a 4 sem.	Primera desparasitación general	Nematodos gastrointestinales y pulmonares	Fenbendazol, Ivermectina o Levamisol
6 a 8 sem.	Segunda desparasitación	Refuerzo contra nematodos y ácaros	<b>Ivermectina</b> (inyectable o oral)

### Cerdos de engorde (8 semanas - sacrificio)

Frecuencia	Tipo de parásito	Desparasitante sugerido
Cada 6-8 semanas	Nematodos gastrointestinales, pulmonares y externos (sarna, piojos)	Ivermectina, Doramectina o Levamisol
1 mes antes del sacrificio	Última desparasitación (según retiro)	Todos

### Cerdas reproductoras (madres)

Etapas	Tratamiento	Desparasitante sugerido
1-2 semanas antes del parto	Desparasitación general para evitar transmisión a lechones	Ivermectina o Fenbendazol
2 veces al año (mínimo)	Control general	Alternar productos para evitar resistencia

### Verracos (machos reproductores)

Frecuencia	Desparasitante sugerido
Cada 4-6 meses	<b>Ivermectina</b> o combinación con <b>Fenbendazol</b>

