



**Nombre de alumno: Jhoan Alejandro
Díaz Abarca**

**Nombre del profesor: Sandra Edith
Moreno López.**

**Nombre del trabajo: Calendario de
vacunación y desparasitación.**

Materia: Zootecnia de puerco.

Grado: 6to.

**Grupo: Medicina veterinaria y
zootecnia.**

Ocosingo, Chiapas 04 de agosto del 2025

CALENDARIO DE VACUNACIÓN Y DESPARACITACIÓN EN PORCINO

FASE: RECIEN NACIDO (0-8 SEMANAS)

Edad	Producto	Enfermedad que previene	Vía	Consideraciones
Día 1-3	Hierro dextran (200k mg)	Anemia ferropénica	Inyectable (IM)	Lechones nacen sin reservas de hierro, aplicar antes de la primera semana.
Día 7	Vitaminas A, D, E	Deficiencia inmunológicas	Inyectable	Apoya el desarrollo del sistema inmune.
Día 21	Vacuna contra Mycoplasma hyopneumoniae	Neumonía enzoótica porcina	Inyectable (IM)	Aplicar antes del destete, especialmente en climas húmedos como Ocosingo
Día 25-28	Vacuna contra Circovirus porcino tipo 2	Circo virosis	Inyectable	Importante en zonas con alta mortalidad post-destete.

FASE: CRECIMIENTO Y CEBA (8-24 SEMANAS)

Edad	Producto	Enfermedad que previene	Vía	Consideraciones
Semana 8	Vacuna contra PRRS	Síndrome reproductivo y respiratorio porcino	Inyectable	Requiere manejo bioseguro; evitar estrés
Semana 9	Ivermectina/ albendazol	Parasito gastrointestinales y pulmonares	Inyectable/ oral	Desparasitación cada 2-3 meses.
Semana 10	Vacuna contra erisipela	Erisipela porcina	Inyectable	En cerdos de ciclos largos o reproductores.
Semana 14	Refuerzo de circovirus	Circovirosis	Inyectable	Mejora inmunidad prolongada en engorda prolongada.
Semana 16	Repetición desparasitación	Paracitos internos y externos	Oral/ IM	Puede alternarse ivermectina con levamisol.

FASE: CRECIMIENTO Y CEBA (8-24 SEMANAS)

Edad	Producto	Enfermedad que previene	Vía	Consideraciones
2 Semanas antes de la monta	Vacuna leptospira + parvovirus + erisipela	Aborto, infertilidad	Inyectable	Fundamental para garantizar buena fertilidad y evitar abortos
Durante gestación (día 70-90)	Refuerzo leptospira	Leptospirosis	Inyectable	Evitar pérdidas gestacionales
Cada 6 meses	Desparasitación rotativa	Gastrointestinales, sarna, piojos	IM/ oral	Rotar principio activo para evitar resistencia.