



**Mi Universidad**

## **Calendario**

*Nombre del Alumno: María Fernanda Santiz Gutiérrez*

*Nombre del tema: Calendario de vacunación en porcinos*

*Parcial : 4*

*Nombre de la Materia: Zootecnia de porcinos*

*Nombre del profesor: Sandra Edith Moreno López*

*Nombre de la licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia*

*Cuatrimestre: 6*

## Lechones (0 – 10 semanas)

<b>EDAD</b>	<b>VACUNA/TRATAMIENTO</b>	<b>VÍA DE APLICACIÓN</b>	<b>CONSIDERACIONES</b>
<b>DIA 1-3</b>	Hierro dextrán (200 mg)	IM	Prevenir anemia. Fundamental en sistemas rústicos.
<b>DIA 3-5</b>	Descole, corte de colmillos y castración	-----	Acompañar con analgésicos/antisépticos
<b>DIA 7</b>	Desparasitación interna (febantel, piperazina)	Oral o IM	Prevención temprana de áscaris y estróngilos
<b>DIA 21-28</b>	Vacuna contra Mycoplasma hyopneumoniae	IM	Enfermedad respiratoria frecuente. Revacunar en 3 semanas
<b>DIA 28-35</b>	Vacuna contra circovirus porcino tipo 2	IM	Patógeno inmunosupresor. Requiere refuerzo.
<b>SEMANA 5-6</b>	Vacuna contra colibacilosis + Clostridium spp	IM	Evita diarreas pre y postdestete.

## Cerdos en desarrollo y engorda (10 semanas – 24 semanas)

EDAD	VACUNA/TRATAMIENTO	VIA DE APLICACIÓN	CONSIDERACIONES
<b>SEMANA 10-12</b>	Refuerzo Mycoplasma y circovirus	IM	Asegura inmunidad en fase crítica de engorda.
<b>SEMANA 12</b>	Vacuna contra Aujeszky (si aplica zona endémica)	IM	Confirmar si zona es endémica. Programas estatales pueden requerirla.
<b>SEMANA 14</b>	Desparasitación interna (albendazol, ivermectina)	IM u oral	Combate larvas migratorias y adultos
<b>SEMANA 16</b>	Baño o inyectable externo (ivermectina o piretrinas)	Tópico o IM	Control de ácaros y piojos. Clave en climas húmedos.

## Reproductoras (nulíparas, gestantes y lactantes)

ESTADO FISIOLÓGICO	VACUNA/ TRATAMIENTO	VIA DE APLICACIÓN	CONSIDERACIONES
<b>6 SEMANAS ANTES DEL PARTO</b>	Vacuna Parvovirus + Leptospira + Erisipela	IM	Proteger camada y evitar abortos
<b>2 SEMANAS ANTES DEL PARTO</b>	Refuerzo contra colibacilosis y clostridiosis	IM	Aumenta anticuerpos en el calostro.
<b>LACTANCIA (SEMANA 3)</b>	Desparasitación interna y externa	Oral + IM	Reducir carga parasitaria en el entorno
<b>CADA 6 MESES</b>	Desparasitación general (rotar principio activo)	Oral o IM	Alternar benzimidazoles e ivermectina para evitar resistencia.