



Nombre del alumno: Hugo Benjamín Aguilar Sánchez.

Nombre de la docente: MVZ. Sandra Edith Moreno López.

Materia: Zootenia de porcinos.

Nombre del trabajo: Calendario de vacunación y desparasitación.

Grupo: Lic. Medicina Veterinaria Y Zootecnia.

## CALENDARIO DE VACUNACION EN PORCINOS

Enfermedad	Tipo de Vacuna ICA	Impacto y Control
Peste Porcina Clásica (PPC)	Obligatoria (ICA)	Control nacional, alta mortalidad, gran impacto económico.
Fiebre Aftosa	Obligatoria en zonas de riesgo	Prevención de brotes transfronterizos.
Enfermedad de Aujeszky	Obligatoria en granjas tecnificadas	Impacto reproductivo y neurológico.
Circovirus (PCV2).	Recomendada	Reducción del Síndrome de Desmedro Post-Destete.
Mycoplasma hyopneumoniae	Recomendada	Prevención de problemas respiratorios crónicos.
PRRS	Según diagnóstico	Reduce pérdidas reproductivas y respiratorias.

Erisipela	Recomendada en reproductores	Previene lesiones cutáneas y fallas reproductivas.
Parvovirus Porcino	Recomendada en reproductores	Previene problemas de infertilidad y
Leptospirosis	Recomendada en reproductores	Previene abortos y problemas reproductivos

<b>Etapa</b>	<b>Edad aproximada</b>	<b>Vacunas principales</b>
Lechones	1–5 semanas	Mycoplasma, PC Salmonela/StreptococcusV2, PRRS, Rinitis,
Destete /Crece	6–12 semanas	APP, refuerzos de Streptococcus, Aujeszky/fiebre local
Reproductoras	6 meses / pre-cría	Eri-sipela, Lepto/parvovirus, Influenza, PRRS, PED, TGE, etc.
Verracos	>6 meses y en servicio	Igual esquema que reproductoras

Muchas vacunas requieren 2 dosis iniciales y luego refuerzos cada 6 meses o anualmente. En zonas de alto riesgo, algunas vacunas se aplican trimestralmente.

Se deben respetar los tiempos de espera en vacunas inactivadas o vivas modificadas.

Calendario de desparasitación.

Cerdas.	6- 8 meses	Ivermectina.
Lechones.	3-4 meses	Albendazol.
verracos	6-7 meses.	Doracmetina.