



**Mi Universidad**

## **Calendario**

*Nombre del Alumno: Daniela Lopez Alvaro*

*Nombre del tema: Sanidad animal*

*Parcial: Tercero*

*Nombre de la Materia: Zootecnia en bovinos*

*Nombre del profesor: Guillermo Montesinos Moguel*

*Nombre de la licenciatura: Medicina veterinaria y zootecnia*

*Cuatrimestre: Sexto*

PLAN DE SANIDAD

**Requerimientos mínimos y disposiciones:**

- Identificado en pieporcas (cabeza, 90% del peso total)
- Desinfectante del ambiente y limpieza de parvientos
- Desparasitación localizada por la enfermedad según edad y gravedad
- Vigilancia en caso de alerta, control de vacados
- Control de inmunidad y desarrollo de anticuerpos, inmunización, seguimiento de vacados
- Monitoreo de la inmunidad de las vacas, control de plagas, control de plagas

**Requerimientos generales:**

- Limpieza, higiene y control de la salud de la vaca
- Desinfectante del ambiente, limpieza de parvientos, limpieza de la vaca
- Desparasitación localizada por la enfermedad según edad y gravedad
- Vigilancia en caso de alerta, control de vacados
- Control de inmunidad y desarrollo de anticuerpos, inmunización, seguimiento de vacados
- Monitoreo de la inmunidad de las vacas, control de plagas, control de plagas



Calendario de vacunacion

Bovinos

| MESES | EDAD                                                                             | DOSIS                                                     | REVACUNACION                                                                                  | NOMBRE                                                              | ENFERMEDAD                                                                   | OPCIONES                                                                         | VIA DE ADMINISTRACION |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ENE   | Terminos (2-4 meses)                                                             | 2 ml                                                      | CADA 6 M                                                                                      | Vacunas tradicionales                                               | Fiebre aftosa                                                                | BIOAFTOGEN®<br>OUROVAC® Aftosa                                                   | SC                    |
| FEB   | Terminos (2-4 meses)<br>Brucelosis (hembras)                                     | Vacuna viva RB-51 o 19                                    | Revacunar cada 12 meses<br>antes de reproducción<br>(única entre 3-9 meses)                   | Vacunas vivas atenuadas para ganado                                 | Brucella abortus                                                             | B. abortus S19<br>B. abortus RB51<br>B. suis strain 2 (SZ)                       | SC<br>IM              |
| MAR   | Vaca adulta<br>3 meses                                                           | 5 ml                                                      | Dosis inicial a los 3 meses +<br>refuerzo a 4 semanas; luego<br>cada 6-12 meses               | Anthrax<br>edema maligno<br>hemorragia bacteriana                   | Carbunclo sintomático, edema maligno,<br>hemoglobinuria                      |                                                                                  | sc cuello             |
| ABRIL | A partir de los 6<br>meses                                                       | combinaciones virales<br>+ bacterianas                    | Primer esquema a los 3 meses (y<br>refuerzo 3-4 semanas después);<br>luego revacunación anual | Vacunas combinadas para<br>complejo respiratorio +<br>leptospirosis | Complejo respiratorio y reproductivo (IBR, BVD,<br>PI3, BRSV, leptospirosis) | Bovilis Vista Onco SQ (MSD)<br>CDVax: ReproductivePlus<br>Bovilis Nasalgen 3-PH4 | SC o IM               |
| MAY   | Novillas/adultas                                                                 |                                                           | Cada 6-12 meses; 4<br>semanas antes de la<br>inseminación                                     |                                                                     | IBR, BVD, PI3, BRSV, leptospirosis                                           |                                                                                  |                       |
| JUN   | plicar 1ª dosis a partir<br>del 1 mes de edad,<br>refuerzos a los 3 y 6<br>meses | - Frecuencia:<br>primer dosis a 2-3<br>meses; luego anual |                                                                                               |                                                                     | Rabia (zonas endémicas)                                                      | RABIA PARESIANTE®<br>NOBIVAC® RABIA                                              | IM O SC               |