



Bovinos

Nombre del Alumno: Joahan Aldanny Reyes Pérez

Nombre del tema: Calendario de vacunación y desparasitación bovina

Parcial: 3°

Nombre de la Materia: Zootecnia de bovinos

Nombre del profesor: Guillermo Montesinos Moguel

Cuatrimestre: 6°

CALENDARIO DE DESPARASITACION PARA BOVINOS DE CARNE

Mes	Tipo de parasito	Fármaco comercial	Principio activo	Vía de administración
Enero	Endoparásitos (nematodos gastrointestinales y pulmonares)	Ivomec, Bovimec, Iverfull	Ivermectina al 1%	Subcutánea
Marzo	Ectoparásitos (garrapatas, moscas y piojos)	Bayticol, Butox p, Ectonil	Flumetrina/ Deltametrina	Tópica o por baño del animal
Mayo	Endo y Ectoparasitos	Ivomec gold, Closiver	Ivermectina + Clorsulón/ Closantel	Subcutánea
Julio	Refuerzo contra ectoparásitos (garrapatas, miasis)	Taktic, Neguvon, Trucid	Amitraz/ Triclorfón	Topica (baño o aspersión)
Septiembre	Trematodos (fasciola hepática)	Fasinex, Flukiver, Trivantel	Triclabendazol	Oral
Noviembre	Endo y ectoparásitos (refuerzo general)	Closiver, Bovimec plus, Master LP	Closantel + Ivermectina	Subcutanea

CALENDARIO DE VACUNACIÓN EN BOVINOS DE CARNE

Plan de vacunación

VACUNA	EDAD DE VACUNACIÓN	REVACUNACIÓN	DOSIS Y VÍA DE APLICACIÓN	OBSERVACIONES
FIEBRE AFTOSA	Todas las edades	Cada seis meses	2 ml vía subcutánea en la paleta o tabla del cuello	Según calendario oficial
BRUCELOSIS	Termeras entre tres y ocho meses	Dosis única a termeras	2 ml vía subcutánea	De acuerdo al programa oficial
TRIPLE (CARBÓN SINTOMÁTICO, SEPTICEMIA, OTRAS CLOSTRIDIOSIS)	Machos y hembras desde los tres meses	15 días después de la primera dosis; luego anualmente	2 y 5 ml vía subcutánea según marca comercial	La revacunación a los 15 días después de la primera dosis es indispensable para la efectividad del biológico
CARBÓN BACTERIDIANO	De tres meses en adelante	21 – 30 días después de la primera, luego anual	2 ml vía subcutánea	En áreas de presentación
RABIA BOVINA	De cuatro meses en adelante	Anual	2 ml vía intramuscular	Según la presentación de la enfermedad en la zona.
IBR – DVB – LEPTOSPIROSIS (ALGUNAS INCLUYEN PI3, CAMPYLOBACTER)	De tres meses en adelante en hembras y machos para reproducción	Un mes después de la primera dosis; luego anualmente	5 ml intramuscular	Aplicación con asesoría del médico veterinario, previo diagnóstico de la enfermedad en el predio
	Hembras de seis meses antes del servicio	Al mes Un mes posparto Luego anual	5 ml intramuscular	
ANAPLASMOSIS Y BABESIOSIS	3 y 12 meses de edad	3 y 12 meses de edad	2 ml intramuscular (cada vial independiente)	Su aplicación requiere asesoría de un médico veterinario

RECOMENDACIONES:

- Rotar principios activos cada año para evitar resistencia.
- Aplicar siempre según peso vivo del animal
- Registrar cada aplicación para llevar un control efectivo del hato
- Tener un buen manejo sanitario y control ambiental