



**Nombre de alumno(a): Deysi Nayeli
Jimenez Lorenzo**

**Nombre del profesor: MVZ. Guillermo
Montesinos Moguel**

**Nombre del trabajo: Plan de sanidad
animal**

Materia: zootecnia de bovinos

Grado: 6°

**Grupo: Medicina Veterinaria y
Zootecnia**



CALENDARIO DE DESPARACITACION

Mes	Tipo de desparasitación	Activo común	Intervalo sugerido	Vía de administración	observación
Enero	Interna y externa	Ivermectina 1%	Inyectable subcutánea	Cada 90 días	Inicio del año control general
Marzo	externa	Cipermetrina o Amitraz	Pour-on o asperson	Cada 30 días	Garrapatas, moscas refuerzos según la carga parasitaria
Mayo	interna	Albendazol o levamisol	Oral o inyectable	Cada 120 días	Control de parásitos gastrointestinales
Julio	Interna y Externa	Doramectina o Ivermectina	Inyectable (SC-IM)	Cada 90 días	Control total uso preferente en recría y vacas preñez media
Septiembre	Externa	Fipronil o Flumetrina	Pour- on o aspersión	Cada 30 días	Revisión prefloración de garrapatas

VACUNAS PARA BECERROS

VACUNAS	PREVIENE	VIA DE ADMINITRACION	PRIMERA APLICACION	REFUERZOS	DOSIS
Adbac Doble bovina	P.moltocida y Costridium chauvoei	Sub cutánea o intramuscular	A partir de los tres meses de edad	A los 21 días y cada 6 o 12 meses	Bovinos 5ml
Adbac/ triple bovina	P.moltucida tipos A y D, C. chauvoei, C. septicum	Subcutánea o intramuscular	A partir de los tres meses de edad	A los 21 días y casa 06 06 o 12 meses	5ml
Adbac / 7 vías	C.chauvoei, C.septicum, C. novyi, C. sordellii, c. perfringens tipos C, D y B	Subcutánea o intramuscular	A partir de los tres meses de edad	A los 21 días y cada 06 o 12 meses	5 ml
Adbac/ 8 vías	C. chauvoei, C.septicum, C.novyi, C.sordellii, c.perfingens tipos C,D y B, P.multocida, M.Haemolytica tipo A1, E.coli	Subcutánea o intramuscular	A partir de los tres meses de edad	A los 21 días y cada 06 o 12 meses	5ml
Adbac/ 11 vías	P.multocida tipos A y D, M.haemolytica, histophilus somni, C.chauvoaei, C.septicum, C.novyi, C.sordellii, C.perfringens tipos c y d	Subcutánea o intramuscular	A partir de los tres meses de edad	A los 21 días y cada 06 o 12 meses	5ml

Adbac/ fiebre carbonosa	Ántrax o fiebre carbonosa	subcutánea	A partir de los tres meses de edad	A los 21 días, y cada 12 meses. O aplicar si hay algún brote en la zona	2ml
-------------------------------	------------------------------	------------	---	--	-----

VACUNAS PARA BOVINOS ADULTOS

VACUNAS	PREVIENE	VIA DE ADMINISTRACION	REFUERZOS	DOSIS
Adbac Doble bovina	P. multocida y Clostridium chauvoei	Subcutánea o intramuscular	15 días previos a la movilización de los animales. Aplicar antes de la temporadas de lluvias y frio	5 ml
Adbac/ triple bovina	P. multocida tipos A y D, C chauvoei, C. septicum	Subcutánea o intramuscular	Cada 06 o 12 meses según la incidencia de la zona. Aplicar antes de la lluvia y frío, 15 previo a la movilización de los animales	5ml
Adbac / 7 vias	C. chauvoei, C.septicum, C. novyi, csordellii, C.perfringens tipos C, D y B	Subcutánea o intramuscular	Cada 06b o 12 meses según la incidencia de la zona, aplicar antes de la temporada de la lluvia, refuerzo ante un brote cercano de clostridiasis de las contenidas en la formula	5ml
Advac/ 8 vías	C. chauvoei, C.septicum, C. novyi, C.sordellii, C.perfringens tipos B, C, y D, P.multocida, M. haemolytica tipo A 1, E. coli	Subcutánea o intramuscular	15 días previo a la movilización de los animales. Para mejorar el calostro y prevenir diarreas en becerros, aplicar 30 días antes del parto. Como refuerzo ante un brote cercano de la clostridiasis contenidas en la formula. Aplicar antes de la temporada de lluvia y frio.	5ml
Adbac/ 11 vías	P. multocida tipos A y D, M.hemolytica, histophilus somni, C.chauvoei, C. septicum, C.novyi. C.sordellii, C.perfringens tipo C y D.	Subcutánea o intramuscular	Cada 06 o 12 meses según las incidencias de la zona. Aplicar antes de la temporada de lluvia y frio.	5ml
Adbac/ fiebre carbonosa	Ántrax o fiebre carbonosa	subcutánea	Cada 12 meses o aplicar si hay un brote en la zona. Aplicar antes de la temporada de lluvia.	2ml

PLAN SANITARIO

ACTIVIDAD	DESACRIPCION	FRECUENCIA
Vitaminas y minerales	Aplicación inyectable de Vit A, D, E o sales minerales	Trimestral o según necesidad
Control de mastitis	CMT, tratamiento en vaca seca	continuo
Control reproductivo	Palpación, ecografía, chequeo de toros	Cada 3-6 meses
Descarte sanitario	Identificación y eliminación de animales con enfermedades crónicas (ej. mastitis, brucelosis positiva)	permanente
Registros sanitarios	Anotar cada manejo, vacunación, tratamiento	siempre
Limpieza de instalaciones	Higienización de corrales, comederos, bebederos	Semanal o según necesidad
Capacitación personal	Buenas prácticas sanitarias y bienestar animal	Anual o semestral

° Consultar las normativas locales de sanidad animal (Senasa u organismo equivalente).

° Adaptar el plan según el clima, zona geográfica y tipo de explotación.

° Siempre trabajar bajo la supervisión de un médico veterinario.

° Mantener la salud del hato bovino, prevenir enfermedades, mejorar la productividad y bienestar animal.

Adler Animal Health – calendario de vacunación rumiantes <https://share.google/rVyHy98jksZKF5xjc>