



DOCENTE: LIC. AMBAR JAQUELINE ALCAZAR CANCINO

ALUMNA: JUANA EIRIKA VAZQUEZ ALBORES

MATERIA: PRACTICAS PROFECIONALES

TRABAJO: RESUMEN

GRADO: NOVENO CUATRIMESTRE

GRUPO: ENFERMERIA

URGENCIAS

Protocolo Pas ha sido llamado proteger, alertar y socorrer esto indica el orden que tenemos que seguir las instrucciones hasta que puedan acudir los equipos

Proteger en primer lugar protegece manteniendo la calma, alertar identificar la zona en la que te encuentres, el numero de heridos tipo de accidente y catástrofe y algún tipo de posible peligro.

Estado grave o critico de coma: conciencia es le proceso fisiológico en el cual el individuo mantiene un estado de alerta

Obnubilación es un estado de depresión completa de vigilia de que el paciente puede ser despertado por un estímulo leve... coma la cual que el paciente no puede ser despertado con ningún estimulo.

Graso de coma: la escala de Glasgow permite no solo la valoración inicial de la profundidad del coma, sino también el seguimiento del paciente comatoso permitiendo detectar con facilidad cambios evolutivos... el shock es un síndrome multifactorial que requiere un enfrentamiento sistematizado para su identificación, clasificación y tratamiento adecuado. El shock hipovolémico es una perdida rápida y masiva de la volemia que acompaña a gran velocidad de trastornos médicos y quirúrgicos

Estado de shock se caracteriza por la incapacidad del corazón o la articulación periférica de mantener la perfusión adecuada de los órganos vitales.

Pasos para atender una emergencia; existen multitudes de situaciones en las que la salud de una persona puede verse afectada pero solo algunas de ellas requieren primero auxilios

Solicitar intención de emergencia o urgencia médica deberá ser realizada por el brigadista de cada piso, valoración primaria actividad que ejecuta el brigadista o el responsable del inmueble que tiene conocimiento de primero auxilios, principales emergencias estas

incluyen las infecciones obstétricas graves, las hemorragias del embarazo, parto y puerperio las complicaciones graves de los estados hipertensivos del embarazo. Tomas aisladas que se presenta previo el embarazo antes de las 20 semanas de gestación, preeclampsia es la presencia de tensión arterial diastólica mayor o igual a 90 mmhg o tensión sistólica mayor o igual a 140. La toma de presión debe hacerse a la paciente con 20 minutos de reposo sentada, con brazo en un ángulo de 4 grados y a nivel del corazón.