

PRUEBA NEUROPSICOLÓGICA DE BENDER

La Prueba Gestáltica Visomotora de Bender (más conocida como Test de Bender) es una de las pruebas neuropsicológicas más utilizadas en niños y adultos para evaluar la maduración neurológica, la coordinación visomotora, la percepción visual y, en algunos casos, indicadores emocionales.



ANTECEDENTES

- Fue una de las primeras pruebas en conectar neuropsicología con evaluación clínica accesible.
- Se sigue utilizando por su facilidad de aplicación y utilidad diagnóstica en entornos educativos, clínicos y neuropsicológicos.

APLICACIÓN Y MANEJO

Voy a mostrarte unas figuras, una por una. Tu tarea es copiarlas lo mejor que puedas en esta hoja. No se trata de hacerlas bonitas, sino de copiarlas tal como las ves."

MAPA CONCEPTUAL DE PSICOMETRIA PT2



CALIFICACIÓN

La calificación del Test de Bender depende de la versión que se utilice. A continuación te explico las dos formas más comunes: la original clínica (por observación cualitativa) y la versión de Koppitz (cuantitativa y proyectiva para niños), que es la más usada en contextos educativos y clínicos infantiles.

INTERPRETACIÓN Y REDACCIÓN DE INFORME

Claro, aquí tienes una guía práctica sobre la interpretación y redacción del informe del Test de Bender, especialmente útil en contextos clínicos, escolares y neuropsicológicos. Incluye cómo integrar los hallazgos, qué lenguaje usar y cómo estructurarlo correctamente.