



ROSSAINE YUDITH MORALES PEREZ

L.N. JULIBETH MARTINEZ

MAPA CONCEPTUAL DE LOS TEMAS
NUTRICION ENTERAL Y NUTRICION
PARENTERAL.

NUTRICION CLINICA

GRADO: 3

GRUPO: "B"

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS A 16 JUNIO 2025

NUTRICION ENTERAL Y NUTRICION PARENTERAL

NUTRICION ENTERAL

La nutrición enteral (NE), también llamada “alimentación por sonda”, es una manera de suministrar nutrición directamente al tracto gastrointestinal (GI) a través de un dispositivo de acceso enteral (sonda de alimentación) cuyo extremo se coloca dentro del estómago o del intestino delgado.

Vía de administración:

- ✚ sonda nasogástrica, sonda nasoduodenal o nasoyeyunal,
- ✚ sonda orogástrica, sonda oroduodenal u oroyeyunal
- ✚ sonda de gastrostomía, sonda de yeyunostomía

Beneficios:

La nutrición enteral ayuda a mantener una digestión y absorción de nutrientes normales a través del tracto gastrointestinal. Aporta los nutrientes necesarios cuando un paciente no puede consumir suficientes alimentos o no recibe los nutrientes necesarios para mantener la salud o recuperarse de una enfermedad o problema de salud.

Complicaciones:

Aunque por lo general la NE se tolera bien, puede estar relacionada con algunos efectos secundarios. Estos pueden incluir:

síntomas gastrointestinales,
problemas metabólicos

NUTRICION PARENTERAL

La nutrición parenteral es una solución estéril intravenosa (IV) que se administra directamente en el torrente sanguíneo a través de un catéter insertado en una vena. Cada mezcla de NP se formula especialmente para satisfacer las necesidades nutricionales del paciente.

Vía de administración:

- ✚ Catéter venoso central
- ✚ Catéter venoso periférico

Beneficios:

La nutrición parenteral brinda los nutrientes necesarios para mantener las funciones corporales adecuadas y el bienestar general.. Aporta los nutrientes necesarios cuando una persona no puede consumir suficientes alimentos o nutrientes por vía oral o a través del tracto GI.

complicaciones

Aunque se trata de un tratamiento de soporte vital/que salva vidas, la NP se puede relacionar con algunas complicaciones, las cuales dependen de cuánto tiempo permanezca una persona con NP. Los efectos secundarios pueden ser:

Problemas metabólicos

Hipertrigliceridemia

Infecciones relacionadas con el catéter venoso y otras complicaciones infecciosas

Trombosis

Enfermedad hepática relacionada con la NP

