



**Nombre del alumno:** SANDRA GUADALUPE MORALES GUZMAN

**Nombre del docente:** Julieth Martínez guillen

**Nombre del trabajo:** mapa conceptual

**Nombre de la materia:** nutrición clínica


**Grado:** 3°

**Grupo:** "B"

es un tipo de alimentación que permite administrar todos los nutrientes o parte de ellos a través del tracto gastrointestinal.



**Tipos de nutrición enteral:**  
nasogástrica, Orogástrica y oroenterina, Nasoenterica, gastrostomía, duodenostomía y yeyunostomía




Prematuros con menos de 24 semanas;  
Síndrome de dificultad respiratoria;  
Malformaciones del tracto gastrointestinal;  
Cuando el individuo sufrió de un traumatismo en la cabeza durante un accidente;  
Síndrome de intestino corto;  
Pancreatitis aguda en fase de recuperación y fístulas enterocutáneas;  
Individuos que sufrieron quemaduras o esofagitis cáustica  
Diarrea crónica y enfermedad inflamatoria intestinal;  
Síndrome de malabsorción;  
Desnutrición grave;  
En trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia nerviosa

cuando un individuo no puede consumir una dieta normal, ya sea porque es necesario ingerir más calorías, porque hay pérdida de nutrientes o porque es necesario que el sistema digestivo permanezca en reposo.



## Nutrición enteral




### Como alimentar una persona con nutrición enteral:

Dieta licuada o artesanal y formulas enteras

La alimentación puede suministrarse por bolo a través de una jeringa o por gravedad; por infusión intermitente donde se administra por gravedad o bomba de infusión, a intervalos de 3 a 4 horas, y cuya duración dependerá de cada individuo y; alimentación por infusión continua, donde se administra la fórmula durante todo el día a un ritmo o velocidad continua a través de una bomba de infusión.

### Existen diversas formulas por ejemplo:

Poliméricas, semielementales, elementales y modulares




es un método de alimentación que se realiza por vía intravenosa, en el cual los nutrientes o parte de ellos se administran directamente al torrente sanguíneo.



Tipos de parenteral:  
Nutrición parenteral central (nps), nutrición parenteral periférica (npp)



este tipo de nutrición parenteral permite la administración de soluciones de alimentación a través de un catéter, que se coloca directamente en una vena de gran tamaño, como la vena cava, por ejemplo. La NPC puede ser utilizada por períodos de más de 7 días



en este tipo de nutrición parenteral, las soluciones de alimentación son administradas a través un catéter colocado en una vena pequeña de la mano o el del brazo, por ejemplo, siendo indicada cuando la persona requiere alimentación parenteral por no más de 7 a 10 días o en personas en las que no es posible o está contraindicada la NPC.


La nutrición parenteral es indicada principalmente en aquellas personas que, por algún motivo, su tracto gastrointestinal no está funcionando o debe mantenerse en reposo.

### Nutrición parenteral

La nutrición parenteral proporciona los nutrientes necesarios cuando una persona no puede consumir suficientes alimentos o nutrientes por vía oral o a través del tubo digestivo.



A corto plazo pueden ocurrir algunas complicaciones relacionadas con la técnica de colocación del catéter como neumotórax, hidrotórax, hemorragia masiva, lesión plexo braquial, catéter mal implantado y lesión vascular.



## Bibliografía

<https://www.tuasaude.com/es/medico-responde/>

<https://www.tuasaude.com/es/nutricion-parenteral/>

