



NOMBRE DEL ALUMNO: KARLA YURENI TOVILLA GARCIA

NOMBRE DEL PROFESOR: MARCOS JHODANY ARGUELLO GALVEZ

MATERIA: PRACTICA CLINICA DE ENFERMERIA

TEMA: LINEAS INTRAVENOSAS

CUATRIMESTRE Y GRUPO 6-A

LICENCIATURA: LIC. ENFERMERIA

FECHA DE ENTREGA: 31/07/2025

lineas intravenosas

1 CAMPO DE APLICACION

Esta norma y sus disposiciones son obligatorias para los establecimientos para la atención médica y personal de salud del sistema Nacional de Salud que realicen la terapia de infusión intravenosa.

-CADA 24 HRS

Si se está infundiendo una solución hipertónica: dextrosa al 10%, 50% nutrición parental.

-CADA 72 HRS

En soluciones hipotónicas e isotónicas.

-INMEDIATAMENTE

En caso de contaminación o precipitación.

2 CAMBIO DE EQUIPOS

3 FIJACION DEL CATETER

Todos los materiales que estén en contacto con el sitio de punción deben ser estériles. El sitio de inserción debe cubrirse con gasa o apósito estéril transparente. Los materiales para la fijación del catéter deben ser, hipoalergénicos y semi permeables.

4 INSUMOS

Todos deben de estar sellados en su envase primario y antes de utilizar deben verificar los siguientes datos: estéril, desechable, libre de pirógenos, la fecha de caducidad, el número de lote y los datos del fabricante.

Antes de iniciar la administración, el personal de salud debe etiquetar el contenedor de la solución con los siguientes datos: nombre del paciente, número de cama, fecha, nombre de la solución intravenosa, hora de inicio, hora de término, frecuencia y nombre completo de quién la instalo.

5 CATETER PERIFERICO CORTO

-El catéter periférico debe seleccionarse con la menor capacidad y longitud más corta, considerando el tipo de terapia prescrita y las características del paciente.

-Se deberá utilizar un catéter por cada punción, minimizando los intentos.

-En caso de utilizar torundas alcoholadas deberán ser preparadas al inicio de cada turno en un recipiente con tapa y desechar las sobrantes.

-No rasurar el sitio de inserción en caso necesario se deberá de recortar el vello.

-Se deberá efectuar la venopunción bajo técnica aséptica.

-Se deberá utilizar técnica de barrera máxima para la instalación del catéter venoso central y en la instalación de catéter periférico se deberá utilizar cubre-boca y guantes.



Tipos de catéteres venosos



LINK DE LA IMAGEN

https://www.canva.com/design/DAGuxjWqie0/Eal77lpnf-UrwRdji54yTA/edit?utm_content=DAGuxjWqie0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

BIBLIOGRAFIA

NOM-022