


- **ALUMNA: EVELIN ABIGAIL CORDERO MORENO**
  - **ASIGNATURA: PATOLOGÍA DEL ADULTO**
  - **DOCENTE: MARIA DEL CARMEN LOPEZ SILBA**
  - **TEMA: UNIDAD II**
  - **LICENCIATURA: ENFERMERÍA**
  - **6° CUATRIMESTRE, GRUPO "A"**
  - **COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS**
- 08 DE JULIO DE 2025**

# UNIDAD II

## HEPATITIS

“HEPATITIS” significa inflamación del hígado.


Esta enfermedad hepática, puede darse como efecto secundario por el contacto con sustancias químicas tóxicas, como el alcohol o las drogas



## CIRROSIS HEPÁTICA.

Cirrosis hepática se refiere a la cicatrización del hígado que da como resultado una función hepática anormal como consecuencia de una lesión hepática crónica


Los signos y síntomas de la cirrosis hepática pueden estar ausentes o no ser específicos en las primeras etapas. Entre los síntomas inespecíficos iniciales tenemos la fatiga y el prurito



## CÁNCER DE HÍGADO.

El cáncer de hígado es una enfermedad por la cual se forman células malignas o cancerosas en los tejidos del hígado

Los síntomas del cáncer del hígado pueden ser parecidos a los de la cirrosis, entre ellos ictericia, fatiga, somnolencia y pérdida de peso. Con frecuencia los pacientes presentan dolor abdominal y masas abdominales.



# UNIDAD II

## COLESISITIS

Presencia de litios (cálculos) en la vesícula. Inflamación de la vesícula biliar ocasionada principalmente por cálculos y con menos frecuencia por barro biliar.

La colecistitis crónica es causada por ataques leves y repetitivos de colecistitis aguda que producen un engrosamiento de las paredes de la vesícula biliar y fibrosis de la misma



## CÁNCER DE VESÍCULA.

El cáncer de vesícula biliar es un tipo de tumor maligno que se origina en las células de este órgano


Síntomas que suelen presentar son ictericia y un síndrome tóxico para neoplásico bastante acusado



## INSUFICIENCIA RENAL.

La insuficiencia renal ocurre cuando uno o ambos riñones ya no funcionan. A veces ocurre rápidamente (agudo) y otras veces es un problema que empeora lentamente con el tiempo (crónico).


Las causas más comunes de la insuficiencia renal: Cáncer, cálculos renales o vesicales, próstata agrandada (hiperplasia prostática benigna, HPB) en los hombres



# UNIDAD II


## PIELONEFRITIS

El mecanismo más frecuente por el que se produce la pielonefritis aguda es el ascenso de microorganismos procedente de la flora fecal a través de los uréteres, que son los conductos que comunican los riñones con la vejiga.



## NEFROPATÍA.


La nefropatía se considera una enfermedad progresiva; en otras palabras, a medida que los riñones se vuelven cada vez menos eficaces.



## LITIASIS.

La litiasis es una condición médica que implica la formación de cálculos o piedras en el organismo

Un cálculo es una masa organizada de cristales que se forma en los riñones cuando la orina se concentra y los factores genéticos, la alimentación, la cantidad de agua ingerida al día, las infecciones de vías urinarias y múltiples enfermedades metabólicas participan en su aparición.



# UNIDAD II

## CÁNCER RENAL

Cáncer o tumor maligno en donde se da pérdida en el control del crecimiento, desarrollo y multiplicación celular, con capacidad de producir metástasis.



## INFECCIÓN URINARIA.

La infección del tracto urinario es una inflamación que puede ocurrir en la vejiga, uretra o riñones, pudiendo ser causada por infecciones bacterianas


- IVU NO COMPLICADA
- BACTERIURIA ASINTOMÁTICA
- CISTITIS AGUDA
- PIELONEFRITIS AGUDA



## CANCER VESICAL

El cáncer de vejiga se origina cuando las células que componen la vejiga urinaria comienzan a crecer en forma descontrolada.

Derivaciones urinarias: a veces, la vejiga se debe extraer o ya no podrá almacenar orina. En estos casos se requiere un tipo de derivación denominado derivación urinaria.




# UNIDAD II

## ADENOMA Y CÁNCER DE PRÓSTATA.


El adenoma es el agrandamiento benigno de la glándula prostática. Mientras que el cáncer es el crecimiento de tejidos malignos.

Los síntomas que pueden aparecer a medida que el cáncer progresa, como el aumento de la frecuencia con que se orina y la dificultad o la urgencia para orinar, suelen estar causados por la presión que el cáncer ejerce sobre la uretra.



## TALLA SUPRAPUBICA.

Este procedimiento consiste en colocar un catéter en la vejiga, a través de la pared del abdomen, para drenar la orina directamente hacia el exterior



## CONCLUSIÓN.

LUEGO DE HABER TRATADO EL TEMA ANTERIOR, CONCLUYO QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA EL CUIDADO DE NUESTRO SISTEMA URINARIO, ASÍ COMO EL RESTO DEL CUERPO. COMO PROFESIONALES DE LA SALUD DEBEMOS FOMENTAR L CUIDADO DE NUESTRO SISTEMA, YA QUE A TRAVÉS DE EL, PASA NUESTRA SANGRE Y DE ESA FORMA LIBERA DESECHOS QUE NUESTRO CUERPO NO NECESITA. ES IMPORTANTE SU BUEN FUNCIONAMIENTO PARA QUE EL RESTO DEL CUERPO PUEDA FUNCIONAR DE MANERA ADECUADA. MUCHAS VECES LOS ADULTOS NO LE PRESTAN LA ATENCIÓN ADECUADA A PEQUEÑOS SÍNTOMAS QUE PUEDEN APARECER EN EL DESARROLLO DE CIERTAS PATOLOGÍAS, Y ES ASÍ COMO ESTAS AVANZAN HASTA HACERSE MAS GRAVES E IMPIDIENDO CONTINUAR CON SUS ACTIVIDADES. MUCHAS PATOLOGÍAS SUELEN SER ASINTOMÁTICAS, SIN EMBARGO, OTRAS QUE PUEDES ASOCIARSE CON OTRAS ENFERMEDADES, Y MIENTRAS ESTAS NO SEAS DETECTADAS, TIENDEN A DESARROLLARSE. ES POR ESTO, QUE DEBEMOS SER MUY CUIDADOSOS CON NUESTRO CUERPO. SI HABLAMOS DEL ÁMBITO HOSPITALARIO, COMO EN EL TEMA DE TALLA SUPRAPÚBICA, SE DEBEN TOMAR LAS PRECAUCIONES CORRESPONDIENTES PARA QUE EN TODO EL PROCESO EVITEMOS QUE BACTERIAS PUEDAN ENTRAR AL ORGANISMO.

## BIBLIOGRAFIA

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/7a48deb82efd688c80b0449b19a97ba3-LC-LEN604%20PATOLOGIA%20DEL%20ADULTO.pdf>