



NOMBRE DEL ALUMNO: KARLA YURENI TOVILLA GARCIA

NOMBRE DEL PROFESOR: FELIPE ANTONIO MORALES HERNANDEZ

MATERIA: ENFERMERÍA DEL ADULTO

TEMA: PROBLEMAS DEL SISTEMA MUSCULO ESQUELÉTICO EN EL ADULTO

LICENCIATURA: LIC. EN ENFERMERÍA

CUATRIMESTRE Y GRUPO: 6-A

FECHA DE ENTREGA: 04/08/2025

problemas del sistema musculoesqueletico en el adulto

luxacion

Una luxación es la pérdida de congruencia completa entre superficies articulares de una articulación. Una SUBLUXACIÓN sería la pérdida de congruencia incompleta entre superficies articulares.



esguince

Un esguince es una rotura incompleta de un ligamento o de un complejo de ligamentos. Una rotura incompleta o rotura parcial no crea inestabilidad en una articulación. La rotura parcial es coloquialmente conocida como "torcedura".

ESGUINCE DE TOBILLO



fractura

Una fractura es la pérdida de continuidad de la sustancia ósea.

clasificacion

- Grado de complejidad
- Mecanismo de producción
- trazo de fractura



contusiones

Es la ruptura total o parcial de un hueso por diversas causas; lo más común es que se deba a un accidente, una caída fuerte o una lesión deportiva. La fractura provoca un dolor intenso y dependiendo de la gravedad puede necesitar cirugía para recomponer el hueso.

tipos

- Fractura completa
- Fractura en tallo verde
- Fractura simple
- Fractura conminuta
- Fractura abierta
- Fractura cerrada
- Fracturas por estrés
- Fracturas por debilidad
- Fracturas por fatiga

CONTUSIONES



PROBLEMAS DEL SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO EN EL ADULTO

fracturas de la base del creneo

Las personas con una tractura de la base del cráneo son ingresadas en el hospital. Se indica reposo en cama y elevación de la cabeza, hasta que se detenga el escape de liquido cefalorraquídeo.

atencion de enfermeria en problemas del sistema musculo esqueletico

Es el sistema que se ocupa del movimiento de nuestro organismo. Son huesos unidos por articulaciones, puestos en movimiento por los músculos al contraerse, gracias a los nervios y a los vasos (los nervios permiten el movimiento).

atención de emergencia

Es importante contar con planes en los que se definan acciones específicas, acondicionamiento de áreas críticas, disponibilidad de recursos, estrategias de operación y comunicación al interior de la unidad y al exterior de las instalaciones como parte del sistema de servicios de salud.

atención domiciliaria

El tipo de asistencia o cuidados que se prestan en el domicilio de pacientes que, debido a su estado de salud o a su dificultad de movilidad, no se pueden desplazar al Centro de Salud que les corresponde.

- Fracturas de cráneo con hundimiento
Frecuentemente, en este tipo de fractura, uno o más fragmentos de hueso ejercen presión hacia el interior del cerebro y lo lesionan. Además, el cerebro queda expuesto al exterior.

- Fracturas de cráneo en niños

En los bebés que tienen una fractura de cráneo, las membranas que rodean el cerebro sobresalen en algún caso a través de una fractura y quedan atrapadas por los bordes de esta, formando un saco lleno de liquido llamado fractura de crecimiento o quiste leptomenigeo.



cuidados de enfermeria

- Alivio del dolor: administrar medicación, paños calientes.
- Cambios en la dieta: lácteos, dieta equilibrada.
- Hábitos higiénicos: sol.
- Ejercicio: con soporte de peso (es esencial), caminar, golf, natación (excelente rehabilitación de la columna).
- Disminuir la posibilidad de traumatismos: zapatos blandos, plantillas acolchadas
- Información: cerciorarnos que hemos sido entendidos.



modelo sectorizados

- Responsabilidad del equipo interdisciplinario
- Responsabilidad del profesional médico
- Responsabilidad del profesional de enfermeria



problemas del sistema musculoesquelético en el adulto

ATENCION CLINICA

constituye un reto actual para las unidades de atención en el primer nivel, ya que la pirámide poblacional se ha invertido, y la población de adultos mayores va en incremento, siendo este grupo etario el que más hace efectivo los servicios de salud.



Los problemas de origen infeccioso y el proceso de atención de Enfermería.

Las enfermedades infecciosas son trastornos provocados por organismos, como bacterias, virus, hongos o parásitos muchos organismos viven en y de nuestros cuerpos.

cuando consultar al medico.

- Te mordió un animal
- Tienes problemas para respirar
- Tienes tos desde hace más de una semana
- Tienes dolor de cabeza intenso con fiebre
- Tienes una erupción cutánea o hinchazón
- Tienes fiebre prolongada y sin causa aparente
- Tienes problemas de visión repentinos

Enfermedades seleccionadas en esta fase



TUBERCULOSIS

es una infección persistente causada por el *Mycobacterium tuberculosis* que, en honor a su descubridor, Roberto Koch, recibe el nombre de bacilo de Koch. Afecta a diversos órganos, pero particularmente los pulmones.

SINTOMAS

- Cansancio intenso.
- Malestar general.
- Sudoración abundante, especialmente al caer el día.
- Pérdida de peso.
- Sangre en los esputos.
- Tos seca, persistente.
- Temperatura corporal que oscila entre los 37 y 37,5 grados.
- No obstante, en ocasiones no aparece ningún síntoma.




problemas del sistema musculo esqueletico en el adulto

gastroenteritis

Es una infección o inflamación de la mucosa del estómago y el intestino que puede estar causada por virus, alimentos contaminados o medicamentos, aunque algunas enfermedades también pueden ocasionar un cuadro sintomático similar.

los virus

- Rotavirus: El rotavirus es la principal causa de gastroenteritis aguda en niños, aunque también puede infectar a personas adultas.
- Norovirus: Afecta a personas de todas las edades, pero su contagio es muy frecuente entre los niños en edad escolar.
- Adenovirus entérico: Los adenovirus son la causa de una buena parte de los casos de gastroenteritis en niños pequeños y representan el segundo agente viral más común causante de diarrea después del rotavirus.
- Astrovirus: Son reconocidos como otro de los agentes virales más comunes de la gastroenteritis infantil en todo el mundo.



meningitis


Es un proceso inflamatorio agudo del sistema nervioso central causado por microorganismos que afectan las leptomeninges. Un 80% ocurre en la infancia, especialmente en niños menores de 10 años.

cuadro clinico

- recién nacido
- lactante
- mayores 1 año

fases de complicaciones

- Fase inmediata (primeras 72 horas)
- Fase mediata (después de 72 horas a siete días)
- Fase intermedia (entre 7 - 14 días)
- Fase tardía (o secuelas postinfección)
-



LINK DE LAS IMAGENES

https://www.canva.com/design/DAGu-G5jBBA/xIXxu0lb9dFzmnxTOMV8Dw/edit?utm_content=DAGu-G5jBBA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

https://www.canva.com/design/DAGu-dRc4r0/BJ7bEetzQFS51yqxv-kyhQ/edit?utm_content=DAGu-dRc4r0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

https://www.canva.com/design/DAGu_YtS8U8/kX6--X4WAw5JgGjd3Hobw/edit?utm_content=DAGu_YtS8U8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

https://www.canva.com/design/DAGvB5P0xZI/QZfSbUkUVSwW40ZiA1IjiA/edit?utm_content=DAGvB5P0xZI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

BIBLIOGRAFIA

ANTOLOGIA DE ENFERMERIA DEL ADULTO UDS 2025. PDF

[d42662f9673fd9e3d3ffd22e82023dbb-LC-LEN605 ENFERMERIA DEL ADULTO.pdf](#)