



Mi Universidad

MAPA CONCEPTUAL

Nombre del Alumno: Carmelita Aguilar Mendez

Nombre del tema: Temas desde el 2.1 al 2.3.4

Parcial: Primero

Nombre de la Materia: Patología del adulto



Nombre del profesor: Lic. María del Carmen López Silva

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: Sexto



PROBLEMAS DE HÍGADO Y VÍAS BILIARES.



El hígado es el órgano visceral más grande del cuerpo; pesa alrededor de 1,3 kg en el adulto. Los problemas hepáticos más comunes son: las hepatitis, la cirrosis y el cáncer de hígado y otras.

PROBLEMAS HEPÁTICOS: HEPATITIS, CIRROSIS HEPÁTICA, CÁNCER DE HÍGADO.

PROBLEMAS BILIARES: COLELITIASIS, COLECISTITIS, CÁNCER DE VESÍCULA.

HEPATITIS

Significa inflamación del hígado, Esta enfermedad hepática, puede darse como efecto secundario por el contacto con sustancias químicas tóxicas, como el alcohol o las drogas

HEPATITIS A
síntomas en adultos:
• Heces de color claro
• orina oscura
• Somnolencia

HEPATITIS B
se contrae a través del contacto con la sangre, semen u otros líquidos corporales de una persona infectada.

HEPATITIS C

CIRROSIS HEPÁTICA

Se refiere a la cicatrización del hígado que da como resultado una función hepática anormal como consecuencia de una lesión hepática crónica

SINTOMAS
Pueden estar ausentes o no ser específicos en las primeras etapas. Entre los síntomas inespecíficos iniciales tenemos la fatiga y el prurito.

DETECCION
Preferiblemente examinando una muestra de tejido del hígado bajo el microscopio, un procedimiento que se denomina biopsia hepática.

CÁNCER DE HÍGADO

Es el segundo cáncer más común en el mundo

CAUSAS
Los virus de la hepatitis B y C a veces pueden causar cáncer.

SINTOMAS
Pueden ser parecidos a los de la cirrosis, entre ellos ictericia, fatiga, somnolencia y pérdida de peso.

COLELITIASIS.

Presencia de litos (cálculos) en la vesícula biliar.

FACTORES QUE CONTRIBUYEN A SU DESARROLLO
Anomalías en la composición de la bilis, exstasia de la bilis e inflamación de la vesícula biliar.

FACTORES DE RIESGO

- Edad
- Sexo femenino
- Obesidad
- Historia familiar.

PROBLEMAS BILIARES: COLELITIASIS, COLECISTITIS, CÁNCER DE VESÍCULA.

COLECISTITIS

Inflación de la vesícula biliar ocasionada principalmente por cálculos y con menos frecuencia por barro biliar, en raras ocasiones ninguna de estas están presentes.

CAUSAS

- Colistitis aguda: por obstrucción litiasica del cístico.
- Colistitis crónica: por ataques leves y repetitivos de colecistitis aguda que producen un engrosamiento de las paredes de la vesícula biliar y fibrosis de la misma,


CÁNCER DE VESÍCULA

Las neoplasias de la vía biliar son infrecuentes y se asocian a una alta mortalidad y mal pronóstico.

SINTOMAS MAS FRECUENTES
Dolor que va a ser visceral, sordo, profundo, persistente, sin exacerbaciones y adscrito al hipocondrio derecho.



PATOLOGÍAS DE ELIMINACIÓN URINARIA Y DISFUNCIÓN RENAL



Las enfermedades renales pueden ponerse de manifiesto tanto a través de datos bioquímicos como clínicos.

INSUFICIENCIA RENAL

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA

se caracteriza por falta de síntomas hasta que las alteraciones llegan a estadios muy avanzados, donde las acciones que se pueden llevar a cabo para retrasar lo máximo posible su avance.

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

En este tipo de insuficiencia renal existe alteraciones de las funciones del riñón se produce de forma brusca.
TIPOS : Pre-renal, Intra-renal, Post-renal

SINTOMAS: Retención de Líquidos y fatiga, Sangre en las heces, Falta de Aliento
DIAGNOSTICO: Ultrasonido renal, TAC del cuerpo, RMN, Biopsia, etc.

PIELONEFRITIS

Es una de las enfermedades más frecuentes que afectan al riñón, aunque no están frecuentes como las infecciones urinarias bajas.

CAUSAS

Es el ascenso de microorganismos procedente de la flora fecal a través de los uréteres

NEFROPATIA

Las nefropatías son causa etiológica de hipertensión arterial y ésta, a su vez, actúa aumentando el deterioro de la función renal, estableciéndose un círculo vicioso.

LITIASIS RENAL Y CANCER

LITIASIS RENAL


Es un problema muy frecuente, evaluado por urólogos.
SINTOMAS Dolor intenso tipo cólicos, náuseas y vómitos. Dolor al orinar, orina con sangre. CAUSAS
 Oxalatos.
 Dieta hiperproteica.
El diagnóstico de la litiasis renal se realiza por los síntomas clínicos y el análisis de la orina.

CANCER RENAL

se da pérdida en el control del crecimiento, desarrollo y multiplicación celular, con capacidad de producir metástasis.



CONCLUSIÓN



Con lo visto en la información anterior podemos concluir que las enfermedades del hígado, vías biliares y aparato urinario representan un grupo significativo de patologías que afectan funciones vitales del organismo. El hígado, con sus múltiples funciones metabólicas, puede verse comprometido por enfermedades como la hepatitis, la cirrosis y el cáncer hepático, muchas veces asociadas al consumo de alcohol, virus y tóxicos. Así como, las patologías biliares como la colelitiasis, la colecistitis y el cáncer de vesícula tienen altas complicaciones graves, por lo cual es importante el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. En cuanto a el sistema urinario puede presentar disfunciones variadas, desde infecciones como la pielonefritis, hasta afecciones crónicas como la insuficiencia renal, que puede ser aguda o progresiva. Factores como hipertensión, diabetes, infecciones recurrentes y cálculos renales inciden directamente en su desarrollo. La detección previa y el diagnóstico médico especializado son importantes para prevenir complicaciones graves y preservar la calidad de vida del paciente. Es esencial que exista un chequeo regular para poder tener conocimiento del estado en el que se encuentran cada uno de nuestros sistemas.

BIBLIOGRAFIA

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/7a48deb2efd688c80b0449b19a97ba3-LC-LEN604%20PATOLOGIA%20DEL%20ADULTO.pdf>

