



Nombre del Alumno: Guadalupe Moshan Vázquez

Nombre del profesor: María del Carmen López Silva

Cuatrimestre: 6

Nombre de la Materia: Enfermería clínica II

Nombre de la Licenciatura : Enfermería

Lugar y Fecha de elaboración: Comitán de Domínguez 16
de junio del 2025

HIPOTIROIDISMOS E HIPERTIROIDISMO.

El hipotiroidismo y el hipertiroidismo son dos condiciones opuestas de la glándula tiroides. El hipotiroidismo ocurre cuando la tiroides no produce suficientes hormonas tiroideas, mientras que el hipertiroidismo sucede cuando la tiroides produce demasiadas.


Hipotiroidismo (glándula tiroidea hipoactiva)

- La glándula tiroidea no produce suficiente hormona tiroidea
- Esto puede causar aumento de peso, estreñimiento, disminución de la frecuencia cardíaca, sequedad de la piel y del cabello, y sensibilidad al frío




Hipertiroidismo (glándula tiroidea hiperactiva)

- La glándula tiroidea produce demasiada hormona tiroidea
- Esto puede causar pérdida de peso, nerviosismo, evacuaciones intestinales frecuentes, sensibilidad al frío y debilidad muscular



Ambos

- Es más probable que afecte a las mujeres
- Los síntomas incluyen fatiga y agrandamiento de la glándula tiroidea, algo conocido como bocio, que puede hacer que su cuello parezca hinchado
- La causa puede ser una enfermedad autoinmunitaria, que hace que su cuerpo se ataque a sí mismo



El hipotiroidismo es más común en las mujeres, en las personas con otros problemas de la tiroides y en las personas mayores de 60 años de edad

Síndrome de Cushing

El síndrome de Cushing es un trastorno causado por niveles elevados de cortisol en el cuerpo, ya sea por producción excesiva de la glándula suprarrenal o por el uso prolongado de medicamentos glucocorticoide




El exceso de cortisol puede producir algunos de los principales síntomas del síndrome de Cushing: una joroba de grasa entre los hombros, la cara redondeada y estrías de color rosado o púrpura en la piel. El síndrome de Cushing también puede causar presión arterial alta o pérdida ósea. Algunas veces, puede provocar diabetes tipo 2.




Síntomas que pueden presentar las mujeres con síndrome de Cushing

- Crecimiento de vello denso y oscuro en la cara y el cuerpo. Esta afección se llama hirsutismo.
- Períodos menstruales irregulares o ausentes.



Síntomas que pueden presentar los hombres con síndrome de Cushing

- Disminución del deseo sexual.
- Disminución de la fertilidad.
- Problemas para alcanzar una erección.



Conclusión

En conclusión, tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo son condiciones que afectan la función de la glándula tiroides y pueden tener un impacto significativo en la salud y el bienestar de una persona. El diagnóstico y tratamiento adecuados son fundamentales para controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida.

El síndrome de Cushing es una condición médica compleja que requiere un diagnóstico y tratamiento precisos para evitar complicaciones graves. La detección temprana y el manejo adecuado pueden mejorar significativamente la calidad de vida de quienes lo padecen.

Bibliografía

- Grossman. Sheila & Mattson Porth Carol (2014). “Porth Fisiopatología Alteraciones de la salud, conceptos básicos” 9ª. Edición. Editorial Lippincott.
- Kasper L. Dennis (2016). “HARRISON Principios de medicina interna” 16ª. Edición.
- Klaus Buckup, Johannes Buckup. “pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular”. 3ª. Edición. Editorial Elsevier Masson.
- Fogo, agnes B. “atlas diagnóstico de patología renal”. 3ª. Edición. Editorial elsevier.
- Patxi ezkurra loiola. Guía de actualización en diabetes mellitus tipo 2.
- Ivan damjanov. (2010). Patología. Elsevier España.
- La salud de los adultos mayores María Alcira Quintero
- Envejecimiento y enfermedades crónicas

https://www.msmanuals.com/es/hogar/trastornos-hormonales-y-metab%C3%B3licos/trastornos-de-la-gl%C3%A1ndula-tiroidea/hipertiroidismo?ruleredirectid=757#Tratamiento_v772064_es