Mi Universidad

Cuadro sinóptico.

Nombre del Alumno: Abraham Morales Mejia.

Nombre del tema: Shock hipovolémico, aborto espontaneo, apendicitis.

Parcial: I

Nombre de la Materia: Prácticas profesionales.

Nombre del profesor: Lic. María del Carmen López Silba.

Nombre de la Licenciatura: Enfermería.

Cuatrimestre: Noveno.

Apendicitis.

Concepto.

Inflamación del apéndice.

Etiología.

Obstrucción en el drenaje de la mucosidad

Se produce una dilatación en el apéndice

A medida que el apéndice se dilata, comprime vasos sanguíneos.

Se produce necrosis y rotura del apéndice.

Aumento de los tejidos linfáticos por infección viral o bacteriana.

Obstrucción por otras circunstancias más complejas tumores o lombrices intestinales.

Cuadro clínico.

Dolor repentino que comienza en el lado derecho de la parte inferior del abdomen.

Dolor repentino que comienza alrededor del ombligo y a menudo se desplaza hacia la parte inferior derecha del abdomen.

Dolor que empeora cuando toses, caminas o realizas otros movimientos bruscos.

Náuseas y vómitos.

Pérdida de apetito.

Fiebre ligera que puede empeorar a medida que la enfermedad avanza.

Estreñimiento o diarrea.

Hinchazón abdominal.

Exámenes de laboratorio y gabinete.

Análisis de sangre.

Análisis de orina.

Examen físico.

Ecografía abdominal.

Tomografía computarizada.

Laparoscopia.

Intervenciones de enfermería.

00132 Dolor agudo: Manejo del dolor.

Observar signos no verbales de molestias.

Explorar el conocimiento y las creencias del paciente sobre el dolor.

Explorar con el paciente los factores que alivian o empeoran el dolor.

Asegurarse de que el paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes.

Utilizar medidas de control del dolor antes de que este sea muy intenso.

Utilizar un enfoque multidisciplinario para el manejo del dolor.

Limpiar la piel del paciente con un agente antimicrobiano apropiado.

Garantizar una manipulación aseptica de todas las vías.

Asegurar una técnica de cuidados de herida adecuada.

Administrar un tratamiento antibiotico, cuando sea adecuado.

Utilizar un sondaje intermitente para reducir la incidencia de infección.

Fomentar el reposo.

00004 Riesgo de infección: Control de infecciones.

Conclusión.

Durante un shock hipovolémico se debe de actuar con rapidez, ya que el retraso en la tención de esta, puede repercutir en graves consecuencias. El aborto espontaneo es cuando ocurre una muerte fetal antes de la semana 20 de gestación, y cuando esto ocurre se debe actuar muy rápido, por otro lado, la apendicitis es una inflamación en el apéndice, originada por distintas causas, cuando esto ocurre la vida del paciente corre peligro. El manejo correcto de estas afecciones es de vital importancia, por ello el personal de salud debe estar altamente capacitado y saber actuar ante estas emergencias que ponen en peligro la integridad física del paciente.

Bibliografía.

UDS.2025. ANTOLOGÍA VIRTUAL DE PRACTICAS PROFESIONALES.PDF

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/1032d1a5001eabc81ed4b5713aa25714-LC-LEN901%20PRACTICAS%20PROFESIONALES.pdf>

MEDLINEPLUS.2025. SHOCK HIPOVOLEMICO. PAGINA WEB

<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000167.htm>