NOMBRE DE ALUMNO: BRYAN ELI GARCIA ZAMORANO

NOMBRE DEL PROFESOR: LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ SILBA

NOMBRE DEL TRABAJO: CUADRO SINOPTICO DE SHOK HIPOVOLEMICO, ABORTO ESPONTANEO, APENDICITIS

NOMBRE DE LA MATERIA: PRACTICAS PROFESIONALES

GRUPO: A

LICENCIATURA: ENFERMERIA

Tipos de shock
Shock anafiláctico
Reacción sistémica de hipersensibilidad de carácter grave.
Shock cardiogénico
Se relaciona con un bajo gasto cardíaco (“falla de bomba”),
asociado generalmente al infarto agudo de miocardio
Shock séptico
Hipotensión arterial debida a la sepsis que persiste
Shock hipovolémico
Es una pérdida rápida y masiva de la volemia que acompaña a
gran variedad de trastornos médicos y quirúrgicos, como traumatismos,
hemorragias digestivas, ginecológicas y patología vascular.
hemorragico
disminucion de la volemia
no hemorragico
perdida de liquido de origen GI, renal, fiebre,
Tratamiento
restaurar eel volumen vascular
minimisar perdida de liquidos
monitorizacion
control de dolor


ABORTO ESPONTANEO
Otros términos para referirse a una pérdida temprana en el embarazo son:
ABORTO CONSUMADO
ABORTO INCOMPLETO
ABORTO INEVITABLE
CAUSAS
Problemas cromosomicos
exposicion a toxinas ambientales
Problemas con la respuesta inmunitaria del cuerpo
Problemas físicos de los órganos reproductores de la madre
tabquismo
sintomas
Lumbago o dolor abdominal sordo, agudo o de tipo cólico
Material tisular o en forma de coágulos que sale de la vaginal
Sangrado vaginal con o sin cólicos abdominales
prevencion
La atención prenatal pronta y completa es la mejor prevención para las complicaciones del embarazo, tales como el aborto espontáneo.
Los abortos espontáneos que son causados por enfermedades sistémicas se pueden prevenir detectando y tratando la enfermedad antes de quedar embarazada.

Apendicitis

causas

- Aumento de los tejidos linfáticos por infección viral o bacteriana
- Obstrucción por otras circunstancias más complejas tumores o lombrices intestinales.

signos y sintomas

- Dolor repentino que comienza en el lado derecho de la parte inferior del abdomen
- Dolor repentino que comienza alrededor del ombligo y a menudo se desplaza hacia la parte inferior derecha del abdomen
- Dolor que empeora cuando toses, caminas o realizas otros movimientos bruscos
- Náuseas y vómitos, Pérdida de apetito
- Fiebre ligera que puede empeorar a medida que la enfermedad avanza

Cuidados de Enfermería

- La recuperación no progresa con velocidad si el apéndice se rompió se formó un absceso en la zona el continuar sin esta pieza en el organismo no ocasiona problemas en referencia de salud.
  - Entre los cuidados que podemos brindar al paciente después de la cirugía encontramos:
    - Manejo del dolor, para mejorar el confort físico
    - Cuidado de la herida quirúrgica. para evitar la aparición de infección
    - Administración de medicamentos.
      - Enseñar de cuidados por operatorios al darse de alta el paciente.