



Mercedes Alejandra Gonzalez Lopez

JOSUE ALEJANDRO ROBLERO DIAZ

SUPER NOTA

SALUD PÚBLICA

Grado: 3

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 18 de junio de 2025.

1.- Antes de tocar al paciente

- Para proteger al paciente de microorganismos que puedan ser transportados por las manos del profesional.



2. Antes de realizar una tarea aséptica

- Incluso si el paciente ya ha sido tocado, se debe repetir el lavado antes de realizar procedimientos como inyecciones, manipulación de heridas, colocación de sondas, etc., ya que estas actividades requieren máxima higiene.




3.-Después del riesgo de exposición a fluidos corporales

- El contacto con sangre, orina, heces, secreciones, o materiales contaminados requiere higiene inmediata, incluso si se usaron guantes, para evitar la diseminación de agentes infecciosos.



4.-Después de tocar al paciente

- El contacto físico con el paciente puede transferir microorganismos a las manos del trabajador. Lavarlas después ayuda a romper la cadena de transmisión.



5.-Después del contacto con el entorno del paciente

- Superficies como la cama, el escritorio, cortinas, monitores, etc., pueden estar contaminadas aunque el paciente no haya sido tocado directamente.



Referencias

Adaptado del cartel de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la
Dirección General de Calidad y Educación en Salud

www.calidad.salud.gob.mx

[dsp-sp_001.pdf](#)