

NOMBRE DEL MEDICO VETERINARIO: **VELAZQUEZ CANCINO REYES ROMAN**

NOMBRE DE LA ALUMNA: **PAZ CRUZ CITLALY JAQUELINE**

MATERIA : **PRODUCCION DE HUEVO**

UNIVERSIDAD: **UDS**

FECHA: **08.06.2025**




BUENAS PRACTICAS DE MANEJO EN LA UNIDAD DE PRODUCCION

Las dimensiones mínimas de las cajas en centímetros

serán: 56 x 46 x15.

- No movilizar más de 100 pollitas por caja.
- La caja puede estar dividida en 4 secciones, para evitar el hacinamiento en las esquinas.
- El fondo de las cajas estará recubierto con un material absorbente e inocuo.



Periodos y programas de alimentación Se debe proporcionar dietas y esquemas de alimentación que aseguren el adecuado aporte de nutrientes, de acuerdo a la etapa productiva, sugiriendo los siguientes períodos de

alimentación:

- Iniciación: desde el nacimiento hasta la semana de 5 - 6 de edad.
- Crianza: desde la semana 6 – 7 hasta la semana 14 -15 de edad.
- Desarrollo o pre-postura: de la semana 15 - 16 de edad, hasta el inicio de postura

con un calendario de iluminación (horas luz), alimentación balanceada, un sistema sanitario para la prevención de enfermedades, etc. Para obtener un ave con las cualidades necesarias para desarrollar una óptima producción de huevo.

La etapa de crianza de la pollita de reemplazo tiene un impacto en la uniformidad de la parvada y se reseñará durante la producción, por lo que se le debe dar la importancia correspondiente a esta etapa. La crianza de pollitas de reemplazo se puede realizar en piso o en jaulas, tomando las siguientes consideraciones para el equipo

LOHMANN LSL-LITE

PONEDORAS

Alojamiento en jaulas

ESP

