



HISTORIA NATURAL

Nombre del Alumno: ESMERALDA VELAZQUEZ DE LA CRUZ

Nombre del tema: VIH

Parcial: 4°

Nombre de la Materia: SALUD PÚBLICA

Nombre del profesor: MARIA DEL CARMEN LÓPEZ SILVA

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 3er cuatrimestre

COMITAN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS A 25 DE JULIO DEL 2025

HISTORIA DE LA ENFERMEDAD

VIH

Agente: virus de inmunodeficiencia humana (VIH)

Huésped: Paciente masculino de 26 años de edad. A.U.L.C
•Parejas sexuales.

Ambiente: Expansión por todo el mundo se da más por regiones accidentales

Periodo de latencia:

Síntomas similares a los de la influenza, gripe, fiebre, dolor de cabeza y erupción cutáneas.

Muerte

El 80% o 90% de los casos fallecen entre los 3-5 años

Estado crónico

Corresponde a la etapa final cuando la enfermedad desaparece o se vuelve crónica y la persona fallece.

Defecto o daño

Trastornos neurológicos, pérdida de las funciones motoras en el conocimiento y la conducta.

Signos y síntomas

perdida de peso al 10% de peso corporal, astenia, fatiga y diarrea.

Cambios tisulares

El virus se encuentra en el plasma, células mononucleares, circulantes en los ganglios y nuevos linfáticos que sufren una inflamación y el VIH continúa multiplicándose

Carcinoma de células escamosas, melanomas, adenocarcinoma.
2 a cuatro semanas se detecta el antígeno del VIH, muchos linfocitos TCD-4 infectados 4 a 12 semanas, aparecen anticuerpos y la inmunidad celular y el antígeno desaparece. Descienden las células infectadas.
Se domina e invade muchos tejidos o el tejido linfoide y los ganglios linfáticos de gran replicación viral.

periodo prepatogenico

periodo patogenico

Fomento a la salud

Educación a la población con respecto a las enfermedades de transmisión sexual y como prevenirlas.

proteccion específica

Actividades realizadas para proteger problemas específicos de salud.
•Utilizar métodos anticonceptivos
•Control en transfusiones.
•Medidas de prevención.

Dx precoz y tto inmediato

Diagnósticos de prueba de detección del VIH.
•Pruebas ELISA o WESTERN BLOT. Estas pruebas detectan anticuerpos en la sangre.
Antiviróticos:
•Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos (ITIN).
•Inhibidores de la integrasa.
•Inhibidores de la proteasa.
Antirretrovirales:
•Abacavir (Ziagen)
•Dolutegravir (Tivicay)
•Emtricitabina (Emtriva)

limitacion del daño

Tener una administración correcta de los antirretrovirales para que la enfermedad no avance.
•Descanso adecuado.
•Consultas periódicas.
•Alimentación adecuada.

Rehabilitación

No hay rehabilitación física, rehabilitación social y mental se alcanza por medio de grupos de apoyo para personas infectadas con VIH para evitar la discriminación y malos tratos.

VIH

En conclusión, el VIH sigue siendo un desafío significativo para la salud pública a nivel mundial, al atacar el sistema inmunológico y, si no se gestiona adecuadamente, llevar al SIDA. Es crucial reconocer las múltiples vías de transmisión y adoptar medidas preventivas efectivas, como el uso de condones y la profilaxis preexposición.

A través del diagnóstico temprano y el tratamiento antirretroviral, las personas con VIH pueden vivir vidas plenas y saludables, subrayando la importancia de la adherencia al tratamiento y el apoyo integral. La educación y la conciencia son herramientas poderosas en nuestra lucha contra el VIH es nuestra responsabilidad colectiva promover la prevención y el acceso a la atención médica para reducir la propagación del virus y garantizar un futuro más saludable para todos. La acción individual y comunitaria es esencial en este camino hacia la erradicación del VIH.

Así el VIH es un virus que ataca el sistema inmunológico y puede causar SI La transmisión del VIH se produce a través de fluidos corporales y la reducción del número de parejas sexuales y la realización de pruebas de VIH regularmente. El tratamiento del VIH implica el uso de medicamentos antirretrovirales que suprimen la replicación del virus y permiten que el sistema inmunológico se recupere. La prevención y el tratamiento adecuados son fundamentales para controlar la propagación del VIH y mejorar la calidad de vida de las personas infectadas.