



NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE: GONZALO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO: JOSUÉ JONATHAN ALFARO GUILLÉN

NOMBRE DE LA MATERIA: METODOS, INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE DIAGNOSTICO VETERINARIO

Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia

Trabajo: Cuadro sinóptico

Parcial: 2

Cuatrimestre: 3ero

Métodos de sujeción en el perro

Inmovilización de la cabeza.

Forma de realizarlo:

¿Cómo inmovilizar un perro agresivo?

Coger con ambas manos la piel del cuello, caudal a las orejas y estirar. Realizar esta operación desde detrás del animal.

Poner un brazo por delante para hacer un bloqueo, mientras que el otro brazo queda escondido detrás de la espalda. "Esto repelerá al perro y le hará no colgarse del brazo, o descolgarse si ya te había mordido".

Colocación del bozal.

Forma de realizarlo:

¿Cuánto tiempo se puede poner un bozal?

Poner el bozal en el hocico y ajustarlo con la hebilla. Utilizar diferentes bozales según el tamaño del perro.

Un perro que tiende a morder los muebles y otros objetos mientras está en el trabajo, entonces su perro puede usar un bozal de canasta por hasta 8 horas,

Utilización de bozal usando lasos o correas en el

Forma de realizarlo:

Sujetar la cabeza y colocar una cinta (trozo de gasa) con un nudo ya hecho

(1) alrededor del hocico

(2). Apretar con rapidez

(3) y hacer un segundo nudo por debajo

Topográficas De Exploración

¿Qué es Anatomía Topográfica en veterinaria?

Es el estudio de las relaciones entre las diferentes partes del organismo

Es uno de los métodos de estudio anatómico de los animales, es subsiguiente, al otro tipo de estudio, que es de carácter descriptivo

¿Qué son las regiones anatómicas en animales?

El cuerpo de un animal se divide didácticamente en las siguientes regiones corporales:

cabeza (cráneo y cara o región facial), cuello, tronco (tórax, abdomen y pelvis), cola y miembros (torácicos y pelvianos).

¿Cuáles son los planos anatómicos principales?

A través del cuerpo se trazan tres planos que conforman un sistema de coordenadas que permitirán la ubicación precisa de las estructuras, estos planos son:

b) Plano Coronal o Frontal.

c) Plano Horizontal o Transversal.

Estado de hidratación del perro y nutrición.

Hidratación

Forma de realizarlo:

Coger un pliegue de piel de la región de la espalda. Si el estado de hidratación es bueno, la piel vuelve inmediatamente a su posición normal.

¿Cómo puedes comprobar si el perro sufre deshidratación?

1. Saliva espesa.
2. Encías y mucosa labial pegajosas o secas.
3. Orina oscurecida.
4. Ojos hundidos y brillo de la córnea.

Y por último el: Aumento del tiempo de relleno capilar, lo que significa que, al presionar la mucosa oral del perro, esta tarda demasiado en recuperar su color anterior

Valorar el estado de nutrición.

Forma de realizarlo:

Valorar por inspección y palpación en diferentes lugares anatómicos.

- (1) Región pectoral
- (2) apófisis espinosas de las vértebras torácicas
- (3) apófisis transversas de las vértebras lumbares
- (4) tuberosidad coxal
- (5) tuberosidad isquiática
- (6) costillas

¿Cómo se evalúa la condición corporal en caninos?

La condición corporal (ICC). Esta escala se basa en la observación de la morfología corporal y la palpación de prominencias óseas y depósitos grasos del paciente.

Constantes fisiológicas.

Valorar la temperatura interna.

Forma de realizarlo:

Colocar el termómetro clínico en el recto, a través del esfínter anal, con movimientos de rotación.

La temperatura normal del perro es de 37,5-39,0 °C.

Valorar la frecuencia del pulso en la arteria femoral.

Forma de realizarlo:

Introducir los dedos de la mano, excepto el pulgar, en la región inguinal, por la parte craneal de la extremidad.

Palpar la arteria y apreciar el pulso con la yema de los dedos, en la parte dorsal de la cara interna de la región inguinal.

Valorar la frecuencia respiratoria.

Forma de realizarlo:

(1) Por inspección de la región costal y abdominal lateral

(2) y por palpación del aire espirado por las fosas nasales

**Exploración De
Mucosas y cavidad
oral.**

Explorar la mucosa
bucal.

Forma de
realizarlo:

Explorar por inspección.
revertir los labios.
Apreciar la coloración.

Explorar la
mucosa bucal

Forma de
realizarlo:

Explorar por inspección.
revertir los labios.

Explorar los
dientes.

Forma de
realizarlo:

Explorar por inspección y palpación.
Explorar los incisivos primero
revertiendo los labios (2) y después
abrir la boca para explorar todos los
dientes.

Explorar la
lengua.

Forma de
realizarlo:

Abrir la boca del animal.
Explorar por inspección y
palpación.

Explorar las glándulas
salivares (parótida).

Forma de
realizarlo:

Explorar por inspección y
palpación en la parte
ventral del ángulo
mandibular.

Nódulos linfáticos explorables.

Explorar los nódulos linfáticos mandibulares.

Forma de realizarlo:

Explorar por inspección y palpación con los dedos de ambas manos simultáneamente, en la parte ventral del ángulo mandibular.

Explorar los nódulos linfáticos cervicales superficiales.

Forma de realizarlo:

Explorar por inspección y palpación con los dedos de la mano, en el borde craneal del músculo supraespinoso.

Explorar los nódulos linfáticos poplíteos superficiales.

Forma de realizarlo:

Explorar por inspección y palpación con los dedos de la mano, a nivel dorsal de la articulación del tarso, en la cara caudal de la extremidad.

Percusión, auscultación,
pulso, llenado capilar,
urogenital.

Percusión (superficial y
profunda) el pulmón.

Forma de realizarlo:

Percutir de forma dígito-digital desde la zona craneal a la caudal y desde la dorsal a la ventral, primero suavemente para delimitar el pulmón (superficial) y luego más fuerte para buscar alteraciones (profunda).

Percutir en los espacios intercostales. El sonido normal es claro o pulmonar.

Palpar el pulso y
realizar la auscultación
cardíaca.

Forma de realizarlo:

Palpar el pulso en la arteria femoral y realizar la auscultación cardíaca al mismo tiempo.

En condiciones normales, la onda del pulso arterial que se palpa tiene que coincidir con el primer tono cardíaco que se ausculta.

Valorar el tiempo de
llenado capilar.

Forma de realizarlo:

Forma de realizarlo: Presionar con el dedo la mucosa de la encía o del labio. Al retirar la presión, debe recuperar el color normal en menos de 2 seg.

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

ANTOLOGIA.UDS.2025