

SHAZADY JEARIM LÓPEZ GONZÁLEZ CUADRO SINÓPTICO PARCIAL 2

MÉTODOS, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO

VETERINARIO

GONZALO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

LIC. MVZ

CUATRIMESTRE 3

## 2.1 METODOS DE SUJECIÓN

Formas de sujetar al perro:
Inmovilización de la cabeza, uso de bozal, restricción general de pie, restricción de pie con apoyo

abdominal, restricción para sentarse, restricción en posición acostada-esternal, restricción en posición acostada- lateral, 1 persona/ 2 personas

TOPOGRAFÍAS

Región anatómica: Nariz, hocico, ojos, orejas auricular, cabeza músculos cervicales, patas anteriores, cola, sistema nervioso central (encéfalo, bulbo, olfatorio, sistema muscular, sistema vestivular (oído interno)

## 2.3 ESTADO DE HIDRATACIÓN Y NUTRICIÓN

Método: turgencia de piel, mucosas orales, tiempo de llenado capilar, ojos, pulso y frecuencia cardiaca Estado más riesgoso: 12%, shock, coma, riesgo de muerte. Urgencia médica

2.4 CONSTANTES
FISIOLÓGICAS

Temperatura: 37.5– 39°C

FR: 10-30 RPM FC: 60-130 LPM T de llenado C: <2s Pas: 110-160 mmHg Pas: 55-110 mmHg

2.5 EXPLORACIÓN DE MUOCSAS Y CAVIDAD ORAL

Mucosa oral (encías, labios)

Color normal: rosado pálido y húmedo

Exploración vaginal(hembras): signos de alerta: flujo

fétido, sangrado fuera del celo


Exploración prepucial(machos): alerta: secreción

verdosa/amarilla, inflamación o masa.

2.6 | NODULOS | LINFÁTICOS | EXPLOTABLES

hay 3 palpables: mandibular, preescapular y poplíteo, y los no palpables suelen ser: parotídeo, retrofaríngeo, axilar e inguinal.

La presencia de que estos últimos nódulos linfáticos sean palpables puede requerir una evaluación más profunda para determinar la causa subyacente.



PERCUSIÓN, AUSCULTACIÓN, PULSO Y LLENADO CAPITAL.

hay 3 palpables: mandibular, preescapular y poplíteo, y los no palpables suelen ser: parotídeo, retrofaríngeo, axilar e inguinal. La presencia de que estos últimos nódulos linfáticos sean palpables puede requerir una evaluación más profunda para determinar la causa subyacente.