



Cuadro Sinóptico

Nombre de la alumna: Lesli Monserrat Sánchez Coronado

Nombre de la asignatura: Métodos, instrumentos y técnicas de diagnóstico veterinario

Nombre del médico: Gonzalo Rodríguez Rodríguez

Nombre de la licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia

Unidad 2

Cuatrimestre 3

UNIDAD II

Métodos de sujeción en el perro

Es muy importante saber sujetar e inmovilizar a un perro de la manera adecuada. Norma general se debe aplicar el mínimo grado de inmovilización que sea necesario.

Uso de bozal se emplea para prevenir mordeduras, especialmente en perros agresivos o nerviosos.

Se coge la piel del cuello por los dos lados y con los pulgares se aprieta hacia delante en la base de las orejas.

Topográficas de exploración

En la anatomía topográfica del perro se utilizan términos específicos para describir la ubicación de las estructuras.

Craneal, caudal, dorsal, ventral, medial, lateral, proximal y distal.

Hacia la cabeza, cola, el lomo parte superior, el abdomen o parte inferior, cerca de la línea media del cuerpo, lejos de la línea media del cuerpo, mas cercano al punto de origen o al tronco y mas alejado del punto de origen o del tronco.

Estado de hidratación y nutrición

Turgencia de piel (pliegue cutáneo), mucosas orales, tiempo de llenado capilar, ojos.

Deshidratación: 5%, 6-8%, 10-12%, >12%

Ojos hundidos, encías secas, orina oscurecida, estado de alerta letargo, fatiga, pulmones jadeo excesivo y saliva espesa.

Constantes fisiológicas

Temperatura normal de un perro: 37.8 y 39.2 c

Frecuencia Cardíaca de un perro: entre 60 y 160 pulsaciones por min. Perros mas pequeños hasta 180. Cachorros 160 y 200

Frecuencia respiratoria: 24 respiraciones por min. En reposo entre 10 y 30, respiración normal comprendida entre 15 y 35 respiraciones por minutos.

Exploración de mucosas y cavidad oral

Es una parte esencial del examen físico general.

Mucosa oral (rosado pálido y húmedo. encías, labios) color normal

Mucosa vaginal sana: rosada, húmeda, sin secreciones anormales.

Mucosa prepucial normal: rosada, limpia, sin secreción.

Nódulos linfáticos explorables

Palpar los nódulos linfáticos puede ayudar a detectar inflamación o agrandamiento puede ser indicativo de infección, inflamación o neoplasia.

Normalmente hay 3 palpables: mandibular, preescapular y poplíteo.

No palpables suelen ser: parotídeo, retrofaríngeo, axilar e inguinal.

Percusión, auscultación, pulso y llenado capilar

La percusión en perros es una técnica de exploración física que consiste en golpear suavemente la superficie corporal con los dedos o instrumentos para valorar las características internas.

Auscultación pulmonar: hemitórax derecho e izquierdo: craneal, medio, caudal y ventral/dorsal.
Auscultación abdominal: cuadrantes craneales y caudales, derechos e izquierdo.
Auscultación cardíaca: lado izquierdo, costillas 3-6 aprox.

Coloca al perro en estación o decúbito lateral. Usa el índice y medio, para palpar la parte interna del muslo donde la arteria femoral cruza el musculo sartorio cuenta los latidos por 15 seg, y multiplica por 4.

El tiempo de llenado capilar refleja el estado de la circulación periférica del animal. La superficie de la mucosa es lisa, húmeda y brillante, color rosa pálida, sin lesiones