



**Mi Universidad**

## **“Caso Clínico”**

*Nombre del Alumno: Lesli Monserrat Sánchez Coronado.*

*Nombre del tema: Caso Clínico.*

*Parcial: 2.*

*Nombre de la Materia: Farmacología y Veterinaria I.*

*Nombre del profesor: José Mauricio Padilla Gómez.*

*Nombre de la Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia.*

*Cuatrimestre: 3.*

¿Que tipo de antiinflamatorio seria mejor en este caso: AINEs o Esteroides?¿Por que?

AINEs, por que presenta un problema de dolor probablemente causada por un golpe y causando la cojera de nuestro paciente.

¿Menciona un farmaco especifico que usarias y justifica su eleccion?

Deramaxx (Deracoxib), ya que es usada para el manejo del dolor e inflamación.

¿Qué precauciones clínicas debes tomar antes de administrar ese fármaco?

Verificar que el paciente no tenga algún problema hepático, renal o gastrointestinal.

¿Cuál sería el riesgo principal si eligieras un esteroide en este caso?

Puede generarle problemas gastrointestinales o de diabetes al paciente.

Si decidieras usar un AINE, ¿Que alternativa ofrecerías en caso de antecedentes gástricos?

Famotidina, para algún problema gástrico.

¿Por qué no debe combinarse un AINE y un Esteroide en este mismo tratamiento?

Por los posibles riesgos secundarios o intoxicación.

¿Qué signos adversos deben monitorearse durante el tratamiento?

La perdida de apetito, vomito o diarrea.



**Clinica Veterinaria  
"Coronado".**

**Md. Lesli Coronado.**

Médica veterinaria  
C. P. 132456798

Dueño(a): Rosendo Batun. Paciente: Sofí. Fecha: 14/06/2025.

Especie: Canina Raza: Mestiza. Advertencias: Antecedentes de gastritis hace 3 meses.

Sexo: Hembra. Peso: 23kg. Edad: 7 años.

**Detalle/Receta:**

-Diagnostico: El paciente tiene signos de cojera intermitente en miembro posterior derecho desde hace dos semanas, sin fiebre ni signos sistémicos.

-Deramaxx 75mg, Deracoxib.

Dosis: Se le dará la paciente 1mg/kg de peso vivo y se dividirá por 75mg que es el total del fármaco, dándole solamente ¼ pastilla cada 24 horas por 3 días. Este medicamento es especial para aliviar el dolor e inflamación en la zona afectada.

-Gastrivet 60mL, Famotidina.

Dosis: Se le dará al paciente 0.5mL/5kg de peso vivo, dándole 2.3mL cada 24 horas, el lapso de este medicamento se quitara cuando el paciente no presente mas malestares que indicara el medico veterinario. Este medicamento es especial para tratar algún futuro antecedente gástrico.

**Recomendaciones:**

Regresar para verificar avances del tratamiento dentro de 3 días.

LesliCoro21@gmail.com | 963-252-6417.

Calle 25 entre 15 y 17, Comitán de Domínguez, Chips. C. P. 30040.