



NOMBRE DEL ALUMNO: KARINA SOLIS HERNÁNDEZ

NOMBRE DEL TEMA: ANTIINFLAMATORIOS ESTEROIDALES Y NO ESTEROIDALES

NOMBRE DEL PROFESOR: MVZ JOSE MAURICIO PADILLA GOMEZ

PARCIAL: UNIDAD 2

NOMBRE DE LA MATERIA: FARMACOLOGIA Y VETERINARIA

NOMBRE DE LA LICENCIATURA: MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

CUATRIMESTRE: 3ER CUATRIMESTRE

CONSULTA VETERINARIA

Fecha: 15 de junio de 2025
Paciente: Perra mestiza
Edad: 7 años
Peso: 23 kg
Motivo de consulta: Cojera intermitente de miembro posterior derecho.
Propietaria: Sra. López

ANAMNESIS:

La propietaria refiere que su perra presenta cojera intermitente del miembro posterior derecho desde hace aproximadamente 2 semanas, más evidente en climas fríos. No hay fiebre, ni signos sistémicos asociados.
No se encuentra bajo tratamiento farmacológico actualmente.
Antecedente importante: gastritis hace 3 meses, resuelta sin complicaciones.

EXAMEN FÍSICO:

Temperatura: 38.6°C

FC y FR normales

Exploración ortopédica: dolor leve a la extensión de la articulación coxofemoral derecha, sin crepitaciones ni inflamación evidente.

No se observan signos de trauma, ni edema.

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO:

Dx presuntivo: Dolor musculoesquelético leve a moderado, posiblemente relacionado con artropatía degenerativa o inflamación articular crónica.
DDx: Displasia de cadera leve, tendinitis, artrosis temprana.
Antecedente de gastritis a considerar antes de indicar tratamiento.

PLAN TERAPÉUTICO:

Se indica tratamiento con AINE selectivo por su buen perfil de seguridad digestiva y efectividad en cuadros musculoesqueléticos crónicos. Se descarta uso de esteroides por riesgo gástrico.

TRATAMIENTO INDICADO:

Meloxicam 1.5 mg/mL solución oral (Metacam®)

Dosis de carga (día 1): 0.1 mg/kg → 1.5 mL vía oral una vez

Dosis de mantenimiento (días 2 a 6): 0.05 mg/kg → 0.75 mL vía oral cada 24 h por 5 días más

Omeprazol 20 mg cápsulas

Dosis: 1 cápsula cada 24 h por 7 días

Vía: Oral

Objetivo: Protección gástrica preventiva

PRECAUCIONES Y SEGUIMIENTO:

Administrar los medicamentos junto con el alimento

Monitorear signos adversos: vómito, diarrea, anorexia, apatía o dolor abdominal

No combinar con otros AINEs ni corticoides

Reevaluación clínica en 5-7 días